

**Fuente :**Diario Oficial de la Federación

**Fecha de publicación:** 30 Septiembre 2008

**NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-003-SSA2-2008, PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.

MAURICIO HERNANDEZ AVILA, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3o. fracción XVII, 13, apartado A), fracción I, 133 fracción I, 134 fracciones VI y VII, 135 y 139 fracción VI, de la Ley General de Salud; 38 fracción II, 40 fracciones III y XI, 41, 43, y 48, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 8 fracciones V y XVI, 10 fracciones VII, XII y XVI, y 45 fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, me permito ordenar la publicación de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-003-SSA2-2008, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector.

**CONSIDERANDO**

Que el 21 de julio de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, para la vigilancia epidemiológica y control de enfermedades transmitidas por vector, y entró en vigor al día siguiente.

Que la Organización Mundial de la Salud emitió desde 2006 un comunicado sobre los efectos adversos de algunos tipos de insecticidas en la exposición de los operadores a dosis inaceptablemente altas de tales productos, tanto en aplicaciones dentro como fuera de las viviendas.

Que dicha recomendación negativa fue ratificada por el grupo de expertos de la Organización Panamericana de la Salud que supervisó el programa de dengue de México entre los días 25 de marzo y el 2 de abril del presente año.

Que el grupo de expertos en insecticidas, integrado con base en la NOM-032-SSA2-2002, tomando en cuenta la necesidad de actualizar constantemente la evidencia científica que permite una mejor atención de los problemas de salud pública en el país, recomendó al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades proponer la adopción de diversas medidas para el uso correcto de los insecticidas.

Que en la actualidad nuestro país experimenta una seria epidemia de dengue clásico y hemorrágico, cuya estrategia principal para su contención es el ataque al mosquito vector *Aedes aegypti* con la aplicación de nuevos insecticidas, sin limitar o favorecer el uso a ciertos productos.

Que en atención a las anteriores consideraciones, se expide la siguiente:

**NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-003-SSA2-2008, PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR**

**PREFACIO**

En la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia participaron las unidades administrativas e instituciones siguientes:

SECRETARIA DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTADOS

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE MARINA

SECRETARIA DE TURISMO

PETROLEOS MEXICANOS

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

UNIVERSIDAD DE CHAPINGO

COLEGIO DE POSGRADUADOS

## **INDICE**

### **0. Introducción**

#### **1. Objetivo**

#### **2. Campo de aplicación**

#### **3. Referencias**

#### **4. Definiciones, símbolos y abreviaturas**

#### **5. Codificación**

#### **6. Diagnóstico de las enfermedades**

#### **7. Sistemas especiales de vigilancia epidemiológica y evaluación**

#### **8. Medidas generales de prevención y control**

#### **9. Medidas específicas de prevención y control**

#### **10. Capacitación**

#### **11. Investigación**

#### **12. Información**

#### **13. Concordancia con normas internacionales y mexicanas**

#### **14. Bibliografía**

#### **15. Observancia de la Norma**

#### **16. Vigencia**

### **0. Introducción**

La importancia que para la salud pública representan las enfermedades transmitidas por vector, radica en cuanto a su magnitud y trascendencia, tomando en consideración la existencia de áreas que reúnen condiciones geográficas, epidemiológicas, demográficas y socioeconómicas, así como de marginación y pobreza de la población afectada, que favorecen su transmisión. Se estima que cerca de 60% del territorio nacional presenta estas condiciones, y que en esa área residen más de 50 millones de personas y se localiza la mayor parte de los centros agrícolas, ganaderos, industriales, pesqueros, petroleros y turísticos importantes.

En ese sentido, la Norma comprende aspectos generales de la vigilancia, prevención, protección y control, aplicables a los seis padecimientos enunciados y aspectos específicos para cada uno de ellos.

Asimismo, se pretende que esta Norma coadyuve a integrar funcionalmente al Sistema Nacional de Salud a las actividades que deben efectuarse en el marco de la descentralización y del Programa Nacional de Salud vigente.

Por otra parte, en virtud de la generación constante de nuevos métodos y técnicas, esta Norma reconoce la necesidad de efectuar investigación esencial, con particular atención en los factores de riesgo y las acciones operativas que, en su momento, deberán ser mejoradas e incorporadas, como procedimientos de vigilancia, prevención y control. Por lo anterior, se promoverá la conformación de grupos nacionales de expertos en insecticidas, parasitología, virología, participación comunitaria, entomología médica, médicos clínicos y epidemiólogos.

### **1. Objetivo**

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer las especificaciones, criterios y procedimientos para disminuir el riesgo de infección, enfermedad, complicaciones o muerte por enfermedades transmitidas por vector.

### **2. Campo de aplicación**

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para el personal de los Servicios de Salud de los sectores público, social y privado que conforman el Sistema Nacional de Salud, que efectúen acciones de vigilancia, prevención y control de las enfermedades objeto de esta Norma.

### **3. Referencias**

**3.1** Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica.

**3.2** Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

**3.4** Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA1-1993, plaguicidas. Productos para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano e industrial. Etiquetado.

**3.5** Norma Oficial Mexicana NOM-044-SSA1-1993, envase y embalaje. Requisitos para contener plaguicidas.

### **4. Definiciones, símbolos y abreviaturas**

#### **4.1 Definiciones**

Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana, se entiende por:

**4.1.1 Acaro**, al artrópodo del orden Acari o Acarida, con cuerpo dividido en prosoma y un epistosoma unido al abdomen; con cuatro pares de patas y partes bucales transformadas en gnastosoma.

**4.1.2 Acaricida**, a cualquier sustancia química que se utilice para eliminar garrapatas y ácaros.

**4.1.3 Aedes**, al género de la clase *Insecta*; del orden Diptera de la familia *Culicidae*, subfamilia *Culicinae*, tribu *Aedini* constituida por 41 subgéneros y 1019 especies mundiales. Las especies *A. aegypti* y *A. albopictus*, son transmisores del flavivirus dengue. Este género puede transmitir también otros Arbovirus.

**4.1.4 Agente infeccioso**, al elemento patógeno biológico, que puede causar la enfermedad; los más importantes para la salud son: 1) virus, 2) rickettsias, 3) bacterias, 4) protozoarios, 5) hongos, y 6) helmintos.

**4.1.5 Agua negra o servida**, al agua que ha sido utilizada por el ser humano para lavado o aseo y que además contiene diversos tipos de desechos sólidos y líquidos, incluyendo las excretas del hombre y de los animales.

**4.1.6 Albañal**, al conducto generalmente cerrado, cuya finalidad es desfogar las aguas negras o servidas.

**4.1.7 Alcantarillado**, al sistema de tubería, de diferentes tipos de material y diámetro, para captar y conducir hacia un destino final las aguas negras, pluviales o residuales.

**4.1.8 Aljibe o cisterna**, al depósito construido con diferentes materiales generalmente subterráneo para coleccionar, almacenar y distribuir el agua.

**4.1.9 Ambiente**, al medio circundante en que nacen, crecen, se reproducen y mueren los seres vivos y en el que se relacionan con todos los elementos físicos, químicos, biológicos y sociales que lo constituyen.

**4.1.10 Anopheles**, al género de la clase *Insecta*, orden Diptera, de la familia *Culicidae*, subfamilia *anophelinæ*, constituida por tres géneros y aproximadamente diez subgéneros y 532 especies en el mundo. Entre las especies más

importantes en México, por ser vectores del paludismo, se encuentran *An. pseudopunctipennis*, *An. albimanus*, *An. vestitipennis*, *An. cruzians* y *An. darlingi*.

**4.1.11 Apirexia**, sin fiebre.

**4.1.12 Asperjar**, al rociar un líquido en gotas de tamaño de 100 a 400 micras.

**4.1.13 Cacharro**, al artículo diverso en desuso, que puede contener agua y convertirse en criadero de mosquitos vectores del dengue.

**4.1.14 Carga de insecticida**, a la cantidad de un preparado de insecticida, en polvo o líquido, necesaria para abastecer el depósito de una bomba aspersora.

**4.1.15 Clorados**, al insecticida, cuya estructura química contiene cloro. Debido a su poder residual y persistencia en el ambiente, se ha restringido el uso del DDT, exclusivamente para fines de salud pública.

**4.1.16 Comunicación educativa**, al proceso basado en el desarrollo de esquemas novedosos y creativos de comunicación social, que permite la producción y difusión de mensajes gráficos y audiovisuales de alto impacto, con el fin de reforzar los conocimientos en salud y promover conductas saludables en la población.

**4.1.17 Control biológico**, al procedimiento que se basa en modelos ecológicos depredador-presa para la regulación y control de las poblaciones vectoriales.

**4.1.18 Control físico**, al procedimiento aplicado para disminuir o evitar el riesgo del contacto vector-humano, efectuando modificaciones en el medio ambiente para eliminar, reducir o modificar el hábitat de los transmisores, en forma temporal o definitiva.

**4.1.19 Control químico**, al procedimiento aplicado contra los vectores, en sus estadios larvarios o inmaduros y de imago o adultos, utilizando sustancias tóxicas con efecto insecticida.

**4.1.20 Criadero**, al lugar donde el vector hembra pone sus huevos desarrollándose posteriormente las fases de larvas, pupas y adulto.

**4.1.21 Criaderos controlables**, aquéllos en los que se puede realizar una acción física para evitar que se infesten o retengan agua. Representan a todos aquellos que la comunidad no identifica como desechables y susceptibles de eliminar en una descacharrización. Su clasificación debe motivar un esfuerzo educativo permanente, a fin de que la comunidad sea capacitada para controlarlos.

**4.1.22 Criaderos controlados**, aquéllos en los que no se desarrollan larvas del vector.

**4.1.23 Criaderos estacionales**, aquéllos que sólo en un periodo determinado del año contengan agua y puedan ser positivos a la presencia de larvas.

**4.1.24 Criaderos permanentes**, aquéllos que se encuentren durante todo el año con agua y frecuentemente con larvas.

**4.1.25 Chapear**, a quitar la yerba.

**4.1.26 Dengue**, a una enfermedad transmitida por mosquitos y producida por arbovirus de la familia *Flaviviridae*, que tiene cuatro serotipos. Su trascendencia radica en que produce brotes explosivos de formas clásicas, con brotes simultáneos de formas hemorrágicas o de choque grave en menor cantidad.

**4.1.27 Descacharrizar**, a recolectar y retirar cacharros de los predios.

**4.1.28 Desinfestación**, a la eliminación de seres pluricelulares parásitos a través de algún proceso físico o químico. Principalmente los artrópodos que se encuentran en el cuerpo de una persona, en la ropa, en el ambiente o en animales domésticos (chinche, piojo, pulga, mosco, garrapata, entre otros). Al referirnos a insectos podemos hablar de desinsectación.

**4.1.29 Ecología**, a la ciencia que estudia las relaciones de los organismos o grupos de organismos con su medio.

**4.1.30 Ecosistema**, a la unidad estructural, funcional y de organización, consistente en organismos (incluido el hombre) y las variables ambientales (bióticas y abióticas) en un área determinada, actuando recíprocamente intercambiando materiales.

**4.1.31 Educación para la salud**, al proceso de enseñanza-aprendizaje que permite, mediante el intercambio y análisis de la información, desarrollar habilidades y cambiar actitudes, con el propósito de inducir comportamientos para cuidar la salud individual, familiar y colectiva.

**4.1.32 Enfermedad de Chagas o "tripanosomosis americana"**, a la enfermedad causada por el protozoario *Trypanosoma cruzi*, transmitido entre animales y humanos por triatóminos o chinches besuconas.

**4.1.33 Enfermedades transmitidas por vector**, a los padecimientos en cuya cadena de transmisión interviene un vector artrópodo, como elemento necesario para la transmisión del parásito, se incluyen: dengue, Leishmaniasis, oncocercosis, paludismo, tripanosomosis y rickettsiosis.

**4.1.34 Enfermo**, a la persona que porta al agente causal de las enfermedades transmitidas por vector, a toda aquella que, con o sin presentar sintomatología, es detectada por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, incluyendo los hallazgos de laboratorio.

**4.1.35 Epidemiología**, al estudio de la frecuencia y características de la distribución de enfermedades, así como de los factores que las determinan, condicionan o modifican siempre en relación con una población, en un área geográfica y en un periodo determinado. Proporciona información esencial para la prevención y el control de enfermedades.

**4.1.36 Equipo de aspersión**, a los aparatos, generalmente bombas, diseñados para rociar los insecticidas al aire o sobre una superficie.

**4.1.37 Flavivirus**, al género del Arbovirus de la familia *Flaviviridae*, del cual se conocen cuatro serotipos causantes del dengue: Den-1, Den-2, Den-3 y Den-4.

**4.1.38 Fomento de la salud**, al proceso cuyo objetivo es lograr la autorresponsabilidad social para el cuidado de la salud.

**4.1.39 Fumigación**, a la desinfección que se realiza mediante el uso de vapores o gases tóxicos, para el control y eventual eliminación de especies nocivas para la salud o que causan molestia sanitaria.

**4.1.40 Garrapata**, al nombre común asignado a un ácaro de las familias *Ixodidae* y *Argacidae*, generalmente son ectoparásitos hematófagos principalmente de mamíferos.

**4.1.41 Hábitat**, al área o espacio con todos sus componentes físicos, químicos, biológicos y sociales, en donde los seres vivos encuentran condiciones propicias para vivir y reproducirse.

**4.1.42 Hospedero**, a la persona o animal vivo que, en circunstancias naturales, permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso.

**4.1.43 Insecto**, al artrópodo de la Superclase Hexápoda que como su nombre lo indica tiene tres pares de apéndices, su cuerpo está dividido en tres regiones bien diferenciales: cabeza, tórax y abdomen.

**4.1.44 Insecticida**, a las sustancias químicas o biológicas que eliminan a los vectores o evitan el contacto con el humano, están dirigidos a cualesquiera de sus estadios de desarrollo (huevo, larva, pupa o imago).

**4.1.45 Imago**, al sinónimo de adulto; insecto que presenta los órganos sexuales desarrollados.

**4.1.46 Imagocida**, al insecticida que mata imagos o adultos de insectos.

**4.1.47 Larva, pupa y ninfa**, a los estados juveniles o inmaduros de un insecto con desarrollo postembrionario de tipo holometábolo.

**4.1.48 Larvicida**, al insecticida que mata larvas de los insectos.

**4.1.49 Leishmaniasis**, a la enfermedad causada por un protozoario del género *Leishmania*, de las especies *L. mexicana*, *L. brasiliensis* y *L. chagasi*.

**4.1.50 Lutzomyia**, al género de la familia Psychodidae, entre las especies más importantes en México están: *Lutzomyia olmeca*, *L. cruciata*, *L. longipalpis*, *L. shannoni* y *L. diabolica*. La única especie en México confirmada como vector es *L. olmeca*.

**4.1.51 Malla, pabellón**, a la red protectora con determinado número de orificios por pulgada cuadrada.

**4.1.52 Nebulización ULV, volumen ultrarreducido**, al procedimiento para la aplicación espacial de los insecticidas, a dosis muy pequeñas en grado técnico, o soluciones concentradas menores de 500 ml/ha, en gotas fraccionadas cuyo diámetro óptimo debe fluctuar entre 15 y 50 micras. Es denominado también rociado especial en aerosol.

**4.1.53 Nebulización térmica**, al tratamiento de un área con aerosoles calientes, tiene lugar por medio de generadores de niebla que transforman una solución de baja concentración en una nube espesa de humo que lleva suspendidas las gotas del insecticida.

**4.1.54 *Onchocerca volvulus***, a la especie de la clase Nemátoda, que es el agente causal de la oncocercosis.

**4.1.55 Oncocercosis**, es una enfermedad infecciosa, crónica, de carácter degenerativo, no mortal, causada por un helminto de la superfamilia *Filarioidea*, y la especie de filaria *Onchocerca volvulus*.

**4.1.56 Organofosforado**, al insecticida donde el fósforo forma parte esencial de su estructura química, clasificado en el grupo de mediana toxicidad. Se utiliza en salud pública por su característica de ser rápidamente biodegradado en el medio.

**4.1.57 Ovipostura**, a la acción y efecto de la hembra de los insectos transmisores, al depositar sus huevecillos en el criadero.

**4.1.58 Paludismo**, a la enfermedad transmitida por mosquitos, que puede manifestarse clínicamente o cursar con infecciones asintomáticas; clínicamente se caracteriza por episodios paroxísticos (fiebre, escalofríos y sudoración), cuando no es tratado oportuna y adecuadamente puede cursar con anemia, esplenomegalia y tener evolución crónica.

**4.1.59 Parásito**, al organismo vivo que crece y se desarrolla, dentro o sobre el hospedero, a sus expensas, causándole daño.

**4.1.60 Participación social**, al proceso que permite involucrar a la población, autoridades locales, instituciones públicas y a los sectores social y privado en la planeación, programación, ejecución y evaluación de los programas y acciones de salud, con el propósito de lograr un mayor impacto y fortalecer un mejor Sistema Nacional de Salud.

**4.1.61 Pediculicida**, a las sustancias que se utilizan para eliminar piojos en todos sus estadios.

**4.1.62 Pediculosis**, a la infestación de la cabeza, las partes vellosas del cuerpo y la ropa (especialmente a lo largo de las costuras interiores), por piojos adultos, larvas y liendres (huevos), que causan prurito intenso y excoriación del cuero cabelludo y del cuerpo por el rascado.

**4.1.63 *Pediculus humanus humanus***, a la especie del piojo del cuerpo del ser humano transferido por contacto directo e indirecto a través de ropas.

**4.1.64 *Pediculus humanus capitis***, a la especie del piojo de la cabeza del ser humano, que se transfiere por contacto directo, de persona a persona.

**4.1.65 *Phthirus pubis***, a la especie del piojo del pubis (ladilla) del ser humano, que se transfiere por contacto sexual.

**4.1.66 Piojo**, al artrópodo del orden Anoplura; clase Insecta y del género *Pediculus*, que se alimentan con sangre del hombre y animales domésticos.

**4.1.67 Piretroides**, a los insecticidas clasificados en el grupo de baja toxicidad aguda, de origen sintético, desarrollados a partir de la investigación del piretro natural, irritantes ligeros.

**4.1.68 Promoción de la salud**, al proceso que permite fortalecer los conocimientos, aptitudes y actitudes de las personas para participar corresponsablemente en el cuidado de su salud y para optar por estilos de vida saludables facilitando el logro y la conservación de un adecuado estado de salud individual, familiar y colectivo mediante actividades de Participación Social, Comunicación Educativa y Educación para la Salud.

**4.1.69 Prueba del torniquete**, a la utilizada para evaluar la fragilidad capilar, consiste en la aplicación de presión con el manguito, hasta el nivel medio de la TA (Ejem: Si el paciente tiene la TA de 120/80 mm de Hg, aplicar 100 mm de Hg de presión, durante 5 minutos), siendo positiva 20 Petequias o más por 2.5 centímetros cuadrados, debajo del área que cubre el brazalete.

**4.1.70 Pulga**, al insecto del orden Siphonaptera (parásitos chupadores, hematófagos), ectoparásitos obligados de mamíferos y aves; presentan el cuerpo comprimido lateralmente. Al parasitar a ratas, puede transmitir enfermedades como la peste al hombre.

**4.1.71 Reacción de Montenegro positiva**, a la prueba cutánea de hipersensibilidad tardía usada como auxiliar del diagnóstico de Leishmaniasis; su aplicación es similar a la prueba de PPD o reacción de Mantoux. Hecha de *Leishmania* sp., muertas por formol o por un extracto total de leishmanias crecidas en condiciones *in vitro*.

**4.1.72 Recaída**, a la reaparición del ciclo exo-eritrocítico como efecto de los hipnozoítos del *P. vivax*, con o sin sintomatología, que obedecen a una infección primaria anterior.

**4.1.73 Recipientes desechables**, aquellos susceptibles de eliminarse mediante una acción de limpieza o descacharrización. La comunidad debe identificarlos como eliminables.

**4.1.74 Rickettsia**, al parásito intracelular obligado, gram negativo, pequeño, en forma de cocobacilo, que se multiplica por división binaria y es causante de diversas enfermedades conocidas como Rickettsiosis.

**4.1.75 Rickettsiosis**, las más importantes son el tifus epidémico o exantemático y tienen por vector al piojo (*Pediculus humanus humanus o corporis*); el tifus murino o endémico, transmitido por pulgas (*Xenopsylla cheopis*); y la fiebre maculosa o manchada cuyos vectores principales son las garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma cajennense* y *Dermacentor variabilis*).

**4.1.76 Recrudescencia**, a la aparición del ciclo eritrocítico de *Plasmodium falciparum* y *P. Malariae* en pacientes con densidades parasitarias muy bajas, no detectables por los procedimientos comunes, pero que existen en la sangre del individuo.

**4.1.77 Rociado domiciliario**, a la aplicación de un insecticida de efecto residual variable, en las superficies de las viviendas y de sus anexos.

**4.1.78 Rodenticida**, a la sustancia química que se utiliza para eliminar a los roedores, generalmente por ingestión.

**4.1.79 Simulium**, al género de la familia Simuliidae, del orden Díptera, de la clase Insecta, cuyas hembras infectadas con las microfilarias de *O. volvulus*, transmiten la oncocercosis de una persona a otra.

**4.1.80 Tamizaje**, al examen o prueba inicial, para diagnóstico presuntivo de alguna patología.

**4.1.81 Tipología de criaderos**, a la clasificación de criaderos según su descripción específica como tambos, llantas, cubetas, recipientes pequeños o grandes, floreros; facilita el diseño operativo del trabajo y su evaluación. Es de utilidad en los esfuerzos para integrar a la población en programas de Promoción de la Salud y Participación Comunitaria, con lo cual se podrán establecer criterios más adecuados para diseñar, ejecutar y evaluar las actividades.

**4.1.82 Tratamiento profiláctico**, al suministro de medicamentos, a grupos de población o individuos en riesgo de contraer una enfermedad, por residir en o trasladarse hacia áreas endémicas. Para fines de esta Norma, se considera tratamiento profiláctico antipalúdico y contra la oncocercosis. Estos tratamientos tienen la finalidad de evitar las infecciones o disminuir las manifestaciones clínicas de la enfermedad, si se adquiere y, además, eliminar la fuente de infección.

**4.1.83 Triatóminos**, al insecto del orden Hemíptera, de la familia Reduviidae, subfamilia Triatominae, cuyas especies de los géneros *Rhodnius*, *Panstrongylus* y *Triatoma* que tienen especies hematófagas y al estar infectadas y picar al hombre, depositan sus deyecciones sobre la piel, para transmitir al *Trypanosoma cruzi*, causante de la Tripanosomosis Americana o Enfermedad de Chagas.

**4.1.84 Transmisores de la enfermedad de Chagas**, a las especies de chinches de mayor importancia epidemiológica: *Triatoma dimidiata*, *T. barberi*, *Rhodnius prolixus*, *Dipetalogaster maxima* y el complejo *T. phyllosoma*, aunque todas las chinches hematófagas pueden transmitir el *T. cruzi*.

**4.1.85 Transmisores de la oncocercosis**, a los dípteros del Género *Simulium*; en México se reconoce como vector principal a *S. ochraceum* y como vectores secundarios a *S. callidum* y *S. metallicum*.

**4.1.86 Transmisores de las Leishmaniasis**, a las mosquitas hembra del género *Lutzomyia* que por su mordedura transmiten al hombre la enfermedad; en México, la única especie que ha sido confirmada como vector es *L. olmeca* y se incrimina a *L. cruciata*, *L. diabólica* y *L. longipalpis*.

**4.1.87 Tratamiento de cura radical**, aquel cuyo objetivo es eliminar todos los parásitos hepáticos y eritrocíticos del enfermo.

**4.1.88 Vector**, al transportador viviente y transmisor biológico del agente causal de enfermedad. Para efectos de esta NOM, se refiere al artrópodo que transmite el agente causal de una enfermedad, por picadura, mordedura, o por sus desechos.

**4.1.89 Vectores del paludismo**, en el país son dos las especies más importantes *An. pseudopunctipennis* y *An. albimanus*.

**4.1.90 Xenodiagnóstico**, al estudio de laboratorio que se realiza para demostrar la presencia del agente etiológico a través de la alimentación del insecto vector no infectado con sangre del individuo sospechoso y posterior análisis de los fluidos del insecto que pudiera contener al parásito.

#### **4.2. Abreviaturas**

°C: grados Celsius

CICOPLAFEST: Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas

cm: centímetro

COMP.: comprimidos

CENAVECE: Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades

DDT: dicloro difenil tricloroetano

DOF: Diario Oficial de la Federación

ELISA: inmunoensayo ligado a enzimas

g: gramo

g/ha: gramo por hectárea

ha: hectárea

HA: hemaglutinación indirecta

ICP: índice de casas positivas

IFI: inmunofluorescencia indirecta

IgG: inmunoglobulina clase G

IgM: inmunoglobulina clase M

InDRE: Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos

kg: kilogramo

LCD: Leishmaniasis cutánea difusa

LCL: Leishmaniasis cutánea localizada

LMC: Leishmaniasis mucocutánea

LV: Leishmaniasis visceral

m<sup>2</sup>: metros cuadrados

mg: miligramo

ml: mililitro

ml/ ha: mililitro por hectárea

mm<sup>3</sup>: milímetros cúbicos

mm de Hg: milímetros de mercurio

No.: número

NOM: Norma Oficial Mexicana

NT: nebulizaciones térmicas

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de la Salud

PCR: reacción en cadena de la polimerasa



RNA: ácido ribonucleico

RT-PCR: transcripción inversa - reacción en cadena de la polimerasa

SISPA: Sistema de Información en Salud para Población Abierta

TA: tensión arterial

TCR: tratamiento de cura radical para paludismo

TDU: tratamiento en dosis única para paludismo

ULV: volumen ultrabajo

VUR: volumen ultra reducido

## 5. Codificación

De acuerdo con la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades transmitidas por vector se codifican de la manera indicada en la "Tabla 1".

**Tabla 1. Clasificación Internacional de Enfermedades Transmitidas por Vector**

Clave de Codificación	Padecimiento
Dengue	
A90	Fiebre del Dengue (Dengue Clásico)
A91	Fiebre del Dengue (Dengue Hemorrágico)
Paludismo	
B50	Paludismo (Malaria) debido a <i>Plasmodium falciparum</i>
B500	Paludismo debido a <i>Plasmodium falciparum</i> con complicaciones cerebrales
B508	Otro paludismo grave y complicado, debido a <i>Plasmodium falciparum</i>
B509	Paludismo debido a <i>Plasmodium falciparum</i> , sin otras especificaciones
B51	Paludismo (Malaria) debido a <i>Plasmodium vivax</i>
B510	Paludismo debido a <i>Plasmodium vivax</i> , con ruptura esplénica
B518	Paludismo debido a <i>Plasmodium vivax</i> , con otras complicaciones
B519	Paludismo debido a <i>Plasmodium vivax</i> , sin complicaciones
B52	Paludismo (Malaria) debido a <i>Plasmodium malariae</i>
B520	Paludismo debido a <i>Plasmodium malariae</i> , con nefropatía
B528	Paludismo debido a <i>Plasmodium malariae</i> , con otras complicaciones
B529	Paludismo debido a <i>Plasmodium malariae</i> , sin complicaciones
B53	Otro paludismo (Malaria) confirmado parasitológicamente.
B530	Paludismo debido a <i>Plasmodium ovale</i>
B531	Paludismo debido a plasmodia (os) de los simios
B538	Otro paludismo, confirmado parasitológicamente, no clasificado en otra parte
B54	Paludismo (Malaria) no especificado
Leishmaniasis	
B55	Leishmaniasis
B550	Leishmaniasis visceral Kala-azar
B551	Leishmaniasis cutánea
B552	Leishmaniasis mucocutánea
B559	Leishmaniasis no especificada
Oncocercosis	

B73	Ceguera de los ríos Infección debida a <i>Onchocerca volvulus</i> <i>Oncocerciasis</i>
Enfermedad de Chagas	
B57	Enfermedad de Chagas
B570	Enfermedad de Chagas, aguda, que afecta al corazón
B571	Enfermedad de Chagas, aguda, que no afecta al corazón
B572	Enfermedad de Chagas (crónica), que afecta al corazón
B573	Enfermedad de Chagas (crónica), que afecta al sistema digestivo
B574	Enfermedad de Chagas (crónica), que afecta al sistema nervioso
B575	Enfermedad de Chagas (crónica), que afecta a otros órganos
Rickettsiosis	
A75	Tifus Excluye: Rickettsiosis debida a <i>Ehrlichia sennetzu</i> o <i>szovetsu</i> (A79.8) Tifus Epidémico, debido a <i>Rickettsia prowazekii</i> , transmitido por piojo
A750	Tifus clásico (fiebre)
A751	Tifus epidémico (transmitido por piojo)
A752	Tifus recrudescente (enfermedad de Brill-Zinsser)
A753	Tifus debido a <i>Rickettsia typhi</i> Tifus murino (transmitido por pulgas)
A759	Tifus debido a <i>Rickettsia tsutsugamushi</i>
A77	Tifus (transmitido por ácaros) de las malezas
A770	Fiebre de Tsutsugamushi
A771	Tifus no especificado
A772	Tifus SAI
A773	Fiebre maculosa (Rickettsiosis transmitida por garrapatas)
A778	Fiebre maculosa debida a <i>Rickettsia rickettsii</i>
A779	Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas Fiebre de San Paolo Fiebre maculosa debida a <i>Rickettsia coronni</i> Fiebre maculosa debida a <i>Rickettsia siberica</i> Fiebre maculosa debida a <i>Rickettsia australis</i> Otras fiebres maculosas Fiebre maculosa no especificada Tifus transmitido por garrapatas SAI

## 6. Diagnóstico de las enfermedades

**6.1 Diagnóstico del Paludismo.** A toda persona sospechosa de paludismo con cuadro febril, escalofríos y sudoración, por residir o provenir de áreas endémicas se le deberá realizar examen microscópico de gota gruesa de sangre y a los contactos de los casos.

La toma deberá hacerse antes de iniciar la administración de cualquier medicamento antipalúdico. La lectura de la muestra y su resultado estarán bajo la responsabilidad de los Laboratorios Estatales de Salud Pública, otros oficiales

(IMSS, ISSSTE, SSA) y privados debidamente autorizados por la Secretaría de Salud. En el caso de localidades que no cuentan con este servicio, la toma y remisión de la muestra al laboratorio más cercano, estará bajo la responsabilidad de personal capacitado de la red de notificación, sea voluntaria o institucional, que asegure la obtención de un diagnóstico veraz y oportuno. Los laboratorios que realicen este diagnóstico, en caso de urgencia estarán disponibles las 24 horas durante todo el año.

**6.2 Diagnóstico del Dengue.** A toda persona con manifestaciones clínicas de la enfermedad; antecedentes de residencia o procedencia de áreas endémicas con transmisión de la enfermedad o con infestación del mosquito *Aedes aegypti* o *Aedes albopictus* y pruebas serológicas positivas, o taxonomía de serotipo del virus de dengue:

**6.2.1** Se deberá de extraer de 5 a 7 ml de sangre de la arteria cubital o radial en la cara anterior del antebrazo, ésta se centrifugará para separar el suero, el cual se enviará al Laboratorio Estatal de Salud Pública. Las técnicas empleadas son: ELISA, para la determinación de anticuerpos IgM e IgG antidengue; Aislamiento Viral y Técnica PCR para la taxonomía de los tipos de virus del dengue.

**6.2.2** Pruebas rápidas de inmunodiagnóstico: prueba de campo que identifica anticuerpos IgM e IgG. Debe utilizarse para estudios epidemiológicos o en casos graves, en las clínicas de febriles de unidades médicas centinelas y en localidades sin infraestructura de laboratorio.

**Tabla 2. Procedimientos para la confirmación etiológica de laboratorio de casos probables de dengue clásico y dengue hemorrágico**

Método	Detección de anticuerpos IgM por ELISA	Cultivo de virus	Identificación de RNA viral por transcripción inversa - reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR)	Detección de anticuerpos IgG por ELISA o por inhibición de la hemaglutinación
Tipo de muestras	Suero obtenido a partir del 8o. día de iniciada la fiebre y hasta 30 días después.	Suero obtenido de 0 a 5 días de iniciada la fiebre (preferentemente en los primeros tres días).	Suero colectado entre el 1o. y 10o. día de iniciada la fiebre.  Sangre heparinizada conservada en refrigeración y enviada inmediatamente al laboratorio. Porción de tejido (hígado, o bazo o cerebro) en solución estéril sin fenol.	Sueros pares colectados en fase aguda y en convalecencia (dos semanas de diferencia entre ambos).
Condiciones de envío	En refrigeración. Sin hemólisis, ni contaminación. Arribo al laboratorio en término máximo de una semana.	En refrigeración. Sin hemólisis, ni contaminación. Arribo al laboratorio en término máximo de una semana.	En refrigeración. Suero sin hemólisis, ni contaminación. Sangre no hemolizada. Tejidos en recipientes con solución estéril. Arribo en el laboratorio en término máximo de tres días.	En refrigeración. Sin hemólisis, ni contaminación. Arribo al laboratorio en término máximo de una semana.
Tiempo de procesamiento	4 días	15 días	2 a 5 días	7 días
Interpretación de resultados	Positivo: Corresponde a infección o reinfección por dengue virus.	Positivo: corresponde a infección reciente por dengue virus serotipo aislado.	Positivo: Indica la presencia de genes virales en la muestra y por lo tanto de infección reciente.	Positivo: Cuando hay seroconversión o el título de anticuerpos se incrementa cuatro o

	Los títulos IgM en reinfección son menos elevados. Negativo: No se demuestra infección reciente por dengue virus.	Negativo: No excluye la posibilidad de infección por dengue virus.	Negativo: No excluye la posibilidad de infección por dengue virus.	más veces entre ambas muestras. Negativo: Cuando no hay seroconversión o el título se mantiene similar en ambas muestras.
Ante un resultado negativo en un caso sospechoso	Enviar una segunda muestra 20 días después de la primera toma, para investigar anticuerpos IgG y aumento de anticuerpos IgM.	Enviar segunda muestra de suero 20 días después de la primera toma, para la determinación de anticuerpos IgG. Determinar en la primera muestra.	Enviar una segunda muestra de suero 20 días después de la primera toma, para la determinación de anticuerpos IgG. Determinar en la primera muestra.	Investigar otros posibles diagnósticos.

**6.2.3 Diagnóstico diferencial.** Abarca un espectro muy amplio de infecciones por virus, bacterias y protozoarios. Debe establecerse un diagnóstico diferencial con la leptospirosis y otras arbovirosis.

**6.3 Diagnóstico de la Oncocercosis.** El diagnóstico se basa en el cuadro clínico y antecedentes de residencia o procedencia de áreas con transmisión de la enfermedad y demostración de las microfilarias; por medio del examen microscópico del líquido sobrenadante de la incubación de biopsia de piel superficial; por identificación de filarias y microfilarias al extirpar nódulos o bien por observación de microfilarias en la córnea y cámara anterior del ojo.

**6.3.1** Se realizará prueba de PCR e hibridación a partir de biopsias o nódulos.

**6.4 Diagnóstico de las Leishmaniasis.** El diagnóstico se basa en el cuadro clínico y antecedentes de residencia o procedencia de áreas endémicas con transmisión de la enfermedad y demostración del protozoario del género *Leishmania*, por medio de estudio microscópico de frotis, impronta de lesiones cutáneas, biopsias de tejidos, intradermorreacción o reacción de Montenegro positiva, en casos de LCL y LMC.

Serología. Positiva en casos de LV, LCD y LMC, por las técnicas de aglutinación, inmunofluorescencia, inmunoenzimática, cultivo e inoculación. En animales de laboratorio, para todas las formas clínicas, PCR e hibridación con sondas específicas para complejo y especies.

**6.4.1 Control de calidad del diagnóstico parasitológico y serológico** estará a cargo del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), apoyado a nivel estatal por los Laboratorios Estatales de Salud Pública. El control de calidad se realizará con el total de las muestras biológicas positivas y el 10% de las negativas.

**6.5 Diagnóstico de la Enfermedad de Chagas o Tripanosomosis Americana.** Se basa en cuadro clínico, asociado a las fases aguda y crónica del padecimiento; antecedentes de residencia en áreas endémicas de la enfermedad, transfusional, madre chagásica y/o transplante de órganos.

**6.5.1** Se confirma el diagnóstico en fase aguda al demostrar la presencia del *Trypanosoma cruzi* o serología positiva en la sangre, por estudio directo o por la técnica de concentración de Strout, cultivo o xenodiagnóstico, serología positiva (HAI, IFI, ELISA y Aglutinación de Partículas).

**6.5.2 Fase indeterminada.** Serología positiva (HAI, IFI, ELISA y Aglutinación de Partículas) y xenodiagnóstico.

**6.5.3 Fase crónica.** El xenodiagnóstico y el cultivo en sangre en medios bifásicos pueden dar resultados positivos, y serología positiva (HAI, IFI, ELISA y Aglutinación de Partículas).

**6.5.4 Confirmación del diagnóstico por laboratorio.** Se establece por la demostración del parásito o bien por al menos dos pruebas serológicas diferentes positivas. Los servicios de salud instalados en áreas endémicas, donde la población está en riesgo de contraer la parasitosis, deben tener conocimiento, para establecer el diagnóstico clínico, parasitológico y serológico. Los criterios de laboratorio para la clasificación de casos clínicos se harán según se indica en la "Tabla 3".

Tabla 3. Criterios para la clasificación de casos de Enfermedad de Chagas

Parásitos por cualquier método	Serología con dos pruebas	Sintomatología	Clasificación
+	+	+	Agudo
+	-	+	Agudo
-	+	+	Agudo
+	+	-	Indeterminado
-	+	-	Indeterminado
-	+	+	Crónico
-	-	+	No caso

**6.5.5** Control de calidad del diagnóstico parasitológico y serológico. Estará a cargo del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), apoyado a nivel estatal por los Laboratorios Estatales de Salud Pública. El control de calidad se realizará con el total de las muestras biológicas positivas y el 10% de las negativas.

**6.6** Diagnóstico de las Rickettsiosis. El diagnóstico del tifus epidémico, tifus murino y fiebre maculosa se basa en el cuadro clínico y antecedentes de residencia o procedencia de áreas endémicas con transmisión de la enfermedad.

#### 6.6.1 Pruebas de laboratorio:

**6.6.1.1** Aglutinación con *Proteus* OX-19 o Weil-Felix. Debe utilizarse de primera intención como prueba de tamizaje. La reacción de Weil-Felix se considera positiva a partir de títulos iguales o superiores a 1:320; en algunos casos, en donde el cuadro clínico sea característico y con antecedentes epidemiológicos, se consideran como positivos los títulos a partir de 1:160.

**6.6.1.2** Detección de anticuerpos IgM o IgG. Por microaglutinación, fijación de complemento o inmunofluorescencia indirecta.

**6.6.1.3** Anticuerpos inmunofluorescentes. No diferencia entre el tifus epidémico y el murino, salvo que se practique absorción diferencial con el respectivo antígeno de *Rickettsia* antes de hacer la prueba o se tipifique con un equipo específico.

#### 6.6.2 Confirmación del diagnóstico por laboratorio. La confirmación de casos se deberá hacer por:

**6.6.2.1** Identificación de las bacterias en frotis de sangre teñidos con alguna de las siguientes técnicas: Giemsa, Macchiavello, Ruiz Castañeda o Giménez.

**6.6.2.2** Serología. Para IgG, tomando dos muestras pareadas, una en la etapa aguda, y otra con dos semanas de diferencia respecto a la primera. Un incremento de cuatro veces o más en los títulos obtenidos, confirma el diagnóstico. Las pruebas de anticuerpos IgM, se tornan positivas al sexto día después de iniciado el cuadro. En la enfermedad de Brill-Zinsser, el anticuerpo inicial es la IgG, a títulos altos  $\geq 1:512$ .

**6.6.2.3** Aislamiento de rickettsias por cultivo. Se realiza de muestras provenientes de reservorios humanos y vectores. Esta técnica sólo se puede efectuar en laboratorios especializados y de alta seguridad.

### 7. Sistemas especiales de vigilancia epidemiológica y evaluación

**7.1** Los procedimientos de vigilancia epidemiológica rutinaria y especiales se deben realizar conforme a lo establecido en la NOM-017-SSA2-1994, para la Vigilancia Epidemiológica.

**7.2** Estudios Entomológicos: Se deben realizar estudios entomológicos para conocer la biología y comportamiento de los vectores en áreas de transmisión o con riesgo y para mantener actualizado el inventario y distribución geográfica de las especies en nuevas áreas.

**7.2.1** Evaluar la eficacia de los productos insecticidas empleados (dosis óptimas, residualidad), así como el rendimiento de los equipos con los que se aplican.

**7.2.2** Identificación taxonómica de las especies.

**7.2.3** Estimación de densidades o hacinamiento de población en sus estadios inmaduros y adultos, en las diferentes estaciones del año.

**7.2.4** Reconocimiento geográfico para ubicar criaderos y refugios naturales, con levantamiento o actualización de croquis.

**7.2.5** Horario de actividad hematófaga.

**7.2.6** Hábitos de alimentación, reposo y vuelo.

**7.2.7** Índice de picadura hora/hombre.

**7.2.8** Disección de ovarios, para determinar edad fisiológica y riesgo de transmisión.

**7.2.9** Valoración de susceptibilidad y resistencia a los insecticidas empleados.

**7.2.10** Evaluación del impacto de las acciones de control de los vectores, incluidas la aplicación de insecticidas o medidas de control físico o biológico.

**7.2.11** Determinación de la prevalencia de vectores infectados por microorganismos.

**7.2.12** Reconocimiento de variaciones en las conductas previas o la introducción de nuevos vectores.

**7.2.13** Índices de infestación por especie y por huésped.

**7.2.14** Valoración de insecticidas y equipos de aspersión con base en el numeral 9.3.1

**7.3** Control de calidad. En caso de la identificación taxonómica de las especies, se enviarán las muestras (ejemplares y ovitrampas) al Laboratorio de Entomología del InDRE cuando el Laboratorio Estatal de Salud Pública no cuente con este recurso de Entomología; si se tiene, el Laboratorio Estatal de Salud Pública deberá mandar para control de calidad al InDRE sólo el 10% de las positivas y el 5% de las negativas. Los ejemplares colectados para envío, se depositarán en frascos, y se preservarán en alcohol al 70%. El material debidamente etiquetado, se remite con formato único de envío de muestras entomológicas del InDRE y copia del formato de captura.

**7.3.1** Estudios entomológicos en paludismo. En las áreas endémicas se deben incluir los siguientes:

**7.3.2** Captura nocturna de anofelinos, intra y peridomiciliaria. Con cebo humano en periodos de entre 6 y 12 horas, según la actividad hematófaga y las preferencias de los vectores; y cuando sea posible incorporar el uso de trampas de luz negra UV.

**7.3.3** Capturas nocturnas de anofelinos reposando fuera de las casas:

**7.3.3.1** En la vegetación del peridomicilio, y

**7.3.3.2** En albergues de animales.

**7.3.4** Capturas diurnas de anofelinos en:

**7.3.4.1** Casas rociadas,

**7.3.4.2** Casas no rociadas, y

**7.3.4.3** Refugios naturales.

**7.3.5** Ensayos de evaluación de máquinas, equipos e insecticidas.

**7.3.6** Pruebas biológicas de pared.

**7.3.7** Medición de gotas de aerosol.

**7.3.8** Pruebas de efectividad de penetración de la niebla.

**7.3.9** Registro de actividades entomológicas. Debe incluir además de la especificación de la localidad y fecha en que se realizan, los datos de condiciones ambientales al momento de efectuar el estudio, que influyen directamente en la actividad de los anofelinos, además se debe concentrar la información por especie y los horarios escalonados de actividad hematófaga.

**7.3.10** Validez de estudios entomológicos. Los ensayos descritos con fines de evaluación, realizados en una sola ocasión, no serán considerados como determinantes para la toma de decisiones, ya que se requiere de mediciones repetidas que muestren la consistencia de los resultados.

**7.3.11 Indicadores entomológicos:**

**7.3.11.1 Promedio de picadura hombre hora:**

Total de anofelinos capturados (por especie)/Total de horas empleadas en la captura

**7.3.11.2 Promedio de anofelinos por casa positiva:**

Total de anofelinos capturados/Número de casas positivas

**7.3.11.3 Porcentaje de refugios positivos:**

Número de refugios positivos X 100/Número de refugios revisados

**7.3.11.4 Promedio de larvas por caladas:**

Total de larvas contabilizadas/Total de caladas efectuadas

**7.3.11.5 Mortalidad en las pruebas de susceptibilidad:**

Total de mosquitos muertos X 100/Total de mosquitos expuestos

**7.3.11.6 Mortalidad corregida:**

Porcentaje de mortalidad mosquitos expuestos – (porcentaje de mortalidad mosquitos testigos) x 100 / 100 – (porcentaje de mortalidad de mosquitos testigos)

**7.3.11.7 Porcentaje hembras múltiples:**

Número de hembras de mosquito múltiples X 100 / Número de hembras de mosquito disecadas

**7.4 Estudios entomológicos en Dengue, en las áreas endémicas se deben incluir los siguientes:**

**7.4.1 Estudio de huevecillos y larvas:**

**7.4.2 Muestreo de casas y encuesta, para inspeccionar recipientes con o sin agua y con o sin larvas.**

**7.4.3 Tipificación de recipientes positivos, para sugerir acciones específicas.**

**7.4.4 Instalación de trampas de oviposición (ovitrampas), para estimación indirecta de infestación de mosquitos hembras.**

**7.4.5 Indicadores entomológicos.** En el caso de los vectores del dengue, el grado de infestación por *Aedes aegypti* o *Aedes albopictus*, se debe conocer mediante el estudio de formas larvianas en los criaderos o la captura de imagos, y se utilizan los siguientes indicadores:

**7.4.5.1 Índice larvario de casas:**

Casas con criaderos positivos X 100/Casas exploradas

**7.4.5.2 Índice larvario de recipientes:**

Recipientes positivos X 100/Recipientes con agua explorados

**7.4.5.3 Índice larvario de Breteau:**

Depósitos positivos X 100/Casas exploradas

**7.4.5.4 Índice de picadura:**

Mosquitos capturados/Horas hombre de exposición

Precauciones. En caso de haber confirmado la circulación de virus, deberá evitarse las capturas con cebo humano, por lo que este índice no se obtendrá.

**7.4.5.5 Índice de pupas:**

Depósitos positivos a pupas X 100/Depósitos positivos

**7.4.6 Criterios Operativos de Control Larvario.** Esta Norma establece los Criterios Operativos de Control, con base en los índices larvarios medidos antes y después de realizar acciones de control, según se indica en la "Tabla 4".

**Tabla 4. Criterios operativos de control**

Nivel de Control Operativo	Indice de Casas Positivas	Indice de Recipientes Positivos	Indice de Breteau
Optimo	< 1	< 0.5	1-4
Bueno	1-4	0.5-1.9	5-9
Alarma	5-9	2-4	10-14
Emergencia	10 o más	5 o más	15 o más

**7.4.7 Evaluación de acciones antilarvarias.** Estas acciones tienen como objetivo eliminar la infestación por larvas, por ello, se considerará que las acciones antilarvarias contra los *aedes* han sido exitosas, sólo cuando se logre obtener Niveles de Control Operativo entre Optimo y Bueno. La evaluación tendrá tres etapas:

**7.4.7.1 Valoración.** Conocer el Indice de Casas Positivas (ICP), en un lapso no mayor a una semana, previa a las intervenciones de control larvario.

**7.4.7.2 Verificación.** Determinar el ICP al día siguiente de la intervención antilarvaria, comparando los valores previos y posteriores del ICP y tipos de recipientes, y por ende, se estará realizando control de calidad de las acciones de control.

**7.4.7.3 Adecuación de acciones.** Si en la verificación, los ICP se encuentran en niveles de alarma o emergencia, se establecerán acciones de capacitación del personal de control antilarvario, inmediatas a la evaluación del impacto, para evitar dispendio de recursos y pérdidas de tiempo en acciones que no tengan el impacto esperado. Si después de la verificación entomológica persisten índices de Alarma o Emergencia, se deben repetir las acciones antilarvarias.

#### **7.5 Estudios entomológicos en Leishmaniasis.**

**7.5.1** Cuando se notifiquen casos de Leishmaniasis en alguna localidad, se programarán encuestas entomológicas, éstas se efectuarán a lo largo de un año, con periodicidad mensual. En caso de no contar con personal suficiente, la periodicidad podrá ser trimestral, empleando, en ambos casos, los formatos especiales para ese fin.

**7.5.2** En las localidades endémicas o de riesgo se deben incluir, además del establecido en el numeral 7.4.2, los siguientes:

##### **7.5.3 Indicadores entomológicos:**

###### **7.5.3.1** Indice de picadura hora/hombre

IIH = Número de *Lutzomyias* capturadas/Horas hombre de exposición

###### **7.5.3.2** Indice de domiciliación:

IID = *Lutzomias* capturadas en el interior del domicilio X 100/Número total de *Lutzomyias* capturadas

###### **7.5.3.3.** Indice de peridomicilio:

IPD = *Lutzomias* capturadas en el peridomicilio X 100/Número total de *Lutzomyias* capturadas

#### **7.6 Estudios entomológicos en la Enfermedad de Chagas.**

**7.6.1** La unidad de Entomología pedirá a los moradores de las viviendas de los casos, que capturen chinches vivas y las depositen en frascos o bolsas de polietileno, previa instrucción en cuanto a su clasificación (diferenciación de otros artrópodos comunes en la vivienda). Se recolectan periódicamente las muestras para su clasificación.

**7.6.2** Se debe identificar los posibles refugios de chinches, intra y peridomiciliarios, con especial atención en los dormitorios; aplicar aerosol de insecticida piretroide en los posibles refugios para provocar la salida de las chinches y facilitar su captura. Se colectan especímenes en todos los estadios evolutivos que se encuentren.

**7.6.3** Revisión de ejemplares capturados. Se determina taxonómicamente el material colectado, se realiza la búsqueda parasitológica de *Trypanosoma cruzi* de preparaciones en fresco y se lee con ayuda de un microscopio compuesto, con el objetivo de 40X. Las preparaciones positivas se procesan para su fijación y tinción con Giemsa.



**7.6.3.1** Indicadores entomológicos:

**7.6.3.2** Índice de Infestación:

Número de casas con triatóminos X 100/Número total de casas estudiadas

**7.6.3.3** Índice de Densidad:

Número total de triatóminos capturados/Número total de casas

**7.6.3.4** Índice de Hacinamiento:

Número total de triatóminos capturados/Número de casas con triatóminos

**7.6.3.5.** Índice de Dispersión:

Número de localidades con triatóminos X 100/Número total de localidades estudiadas

**7.6.3.6.** Índice de Colonización:

Número de casas con ninfas de triatóminos X 100/Número de casas positivas a triatóminos

**7.6.3.7.** Índice de Infección Natural:

Número de triatóminos con *T. Cruzi* X 100/Número de triatóminos estudiados

**7.6.4** Las chinches se colectarán con pinzas de relojero o pinzas entomológicas flexibles, nunca se tomarán con las manos ni se aplastarán ya que el colector podría infectarse accidentalmente.

**7.7** Estudios entomológicos en Rickettsiosis

**7.7.1** Anticuerpos inmunofluorescentes. Esta prueba detecta rickettsias en las garrapatas vectores y se practica en los especímenes colectados en domicilio de los enfermos o en áreas de riesgo.

**7.7.2** Estudios entomológicos en tifus epidémico o exantemático. Para conocer si los habitantes de una localidad están parasitados por piojos (de la cabeza o del cuerpo) se hará una encuesta. Se considerará parasitada la familia cuando en alguno de sus miembros se encuentra un piojo en cualquier etapa evolutiva. Se pueden obtener índices de infestación, por familias o por individuos estudiados, así como por especie, piojos de cabeza o cuerpo.

**7.7.3** Estudios entomológicos en tifus murino o endémico. Se deberá buscar e identificar taxonómicamente las pulgas de los animales que conviven con el hombre, señalando sus índices de infestación por especies vectoras y por huéspedes, especialmente en perros, gatos y ratas. Para lo cual deberán capturarse vivos los reservorios, de lo contrario no se colectará ningún ectoparásito, ya que estos dejan al huésped cuando muere.

**7.7.4** Estudios entomológicos en fiebre maculosa (manchada). Los estudios entomológicos se dirigen a capturar garrapatas en el ganado, roedores y animales silvestres como el venado. Las garrapatas deberán colectarse con su aparato bucal (gnatosoma) completo, de lo contrario no pueden determinarse taxonómicamente. Se deben señalar los índices de infestación por especie vectora y por huésped, además del sitio específico sobre el huésped.

**7.7.5** Todo el personal que capture mamíferos debe estar previamente vacunado contra la rabia.

**7.8** Estudios mastozoológicos. Serán realizados por mastozoólogos con el fin de identificar animales domésticos o silvestres, que sean reservorio de los agentes causales de enfermedades transmitidas por vector. Se deben identificar:

**7.8.1** Especies.

**7.8.2** Conocer su distribución geográfica.

**7.8.3** Estimar densidades de población.

**7.8.4** Describir y analizar conductas.

**7.8.5** Vigilar refugios domésticos y peridomésticos.

**7.8.6** Vigilar animales infectados o enfermos.

**7.8.7** Caracterizar sus contactos con el hombre, longevidad y susceptibilidad a los gérmenes.

**7.8.8** Proponer, diseñar y evaluar medidas de control de reservorios.

**8. Medidas generales de prevención y control**

**8.1 Medidas generales:**

**8.1.1** Se debe informar a la comunidad sobre la importancia de las enfermedades transmitidas por vector, su mecanismo de transmisión y las formas de prevenirlas y controlarlas.

**8.1.2** Se debe orientar y capacitar a la población, en acciones de autocuidado de la salud.

**8.1.3** Se debe promover el mejoramiento de la vivienda y el saneamiento básico.

**8.1.4** Se debe capacitar al personal de salud.

**8.2 Acciones a realizar:**

**8.2.1** En la comunidad. Se debe incrementar los conocimientos de la población, motivar actitudes solidarias y de colaboración ciudadana, así como producir cambios de las conductas adversas a la salud individual o colectiva. Dentro de las acciones de mejoramiento de la vivienda está el resane de paredes, colocación de falsos plafones, mosquiteros en puertas y ventanas, eliminación de sitios de anidación y reproducción de insectos y reservorios, cuidados sobre el agua y basuras, e higiene personal.

**8.2.1.1** Informar a la comunidad sobre la importancia de las enfermedades transmitidas por vector como problema de salud pública, sobre todo del tipo de enfermedades y sus vectores que existen en el país y, principalmente, en la región en que residen o hacia aquellos lugares que frecuentan fuera de su localidad de residencia, por motivos de trabajo.

**8.2.1.2** Brindar a la población los conocimientos básicos sobre los mecanismos de transmisión, del riesgo de adquirir alguna de estas enfermedades y de su repercusión social y económica, con el propósito de motivar la aceptación del Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector, así como su participación en las actividades individuales, familiares y del nivel comunitario.

**8.2.1.3** En virtud de que en las viviendas es en donde generalmente se presentan las condiciones que favorecen la transmisión de estas enfermedades, se deben promover y vigilar acciones concretas, sencillas y económicas para modificar aquellos aspectos que incrementan el contacto de los vectores y la población.

**8.2.1.4** Los representantes de salud deben promover que la participación sea conducida por la comunidad y sus autoridades, apoyando en los diferentes aspectos que la favorecen, hasta lograr que éstas sean parte de la cultura para lograr el bienestar. La participación comunitaria se dirige a controlar los hábitats y evitar el contacto de la población con los riesgos que favorecen la presencia de estas enfermedades.

**9. Medidas específicas de prevención y control**

**9.1** Tratamiento médico del paludismo. Se emplea la combinación de dos medicamentos, la cloroquina que elimina las formas sanguíneas de *P. vivax* y de *P. falciparum*, excepto los gametocitos de éste último y la primaquina que elimina los hipnozoítos de *P. vivax* y los gametocitos de *P. falciparum*. Se ministrarán diferentes esquemas de acuerdo al objetivo que se persiga.

**9.1.1** Recomendaciones generales. La cloroquina y primaquina son medicamentos que en personas sensibles causan:

**9.1.1.1** Irritación gástrica. Siempre deberán administrarse cuando la persona a tratar haya ingerido algún alimento y con abundantes líquidos. Si el paciente vomita 30 minutos después de recibirlo, debe recibir una segunda dosis completa. Si vomita entre 30 y 60 minutos después de una dosis, se le debe dar media dosis adicional. En lo sucesivo pueden fraccionarse las dosis diarias en varias tomas al día.

**9.1.1.2** Primaquina. No debe ministrarse a menores de seis meses de edad, mujeres embarazadas y madres en periodo de lactancia por sus efectos adversos en hígado y la interacción con hemoglobinas fetales; en estos casos se emplea solamente cloroquina a dosis supresivas cada 21 días y una vez que las condiciones antes mencionadas desaparezcan, se ministrará tratamiento completo.

**9.1.1.3** Control médico. Cualquier tratamiento antipalúdico y en particular para menores de seis meses de edad, mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia, enfermos hepáticos y otros padecimientos intercurrentes graves, queda siempre sujeta al criterio y vigilancia médica.

**9.1.2** Tratamiento supresivo. Aquel que se administra sólo para eliminar el ciclo eritrocítico; utilizar la cloroquina como medicamento de elección en caso de infecciones de paludismo *vivax*, y cloroquina más primaquina en regiones con paludismo *falciparum*.

**9.1.2.1** Indicación. A toda persona sospechosa de padecer paludismo se le ministra al momento de tomar la muestra hemática, una dosis única de cloroquina a dosis de 10 mg por kg de peso o según edad y en áreas especiales (de *falciparum*) se agrega primaquina a dosis de 0.25 mg por kg de peso (a los menores de 6 meses y embarazadas no se les ministra este último).

**9.1.2.2** Tratamiento supresivo en áreas con *P. vivax*. Se ministra sólo cloroquina, indicado para áreas de baja transmisión o hipoendémicas, en las mesoendémicas e hiperendémicas el tratamiento de primera elección es la dosis única, (cloroquina-primaquina), posterior a la toma de muestra hemática.

**Tabla 5. Tratamiento supresivo en áreas con transmisión de *P. vivax*.**

GRUPO DE EDAD	NUMERO DE COMPRIMIDOS DE CLOROQUINA 150 mg
< 6 meses	¼
6 meses a 1 año	½
2 a 5 años	1
6 a 12 años	2
13 años y más, con menos de 60 kg de peso	3
13 años y más, con menos de 60 kg de peso	4

**9.1.2.3** Tratamiento supresivo en áreas *P. falciparum*. Al momento de tomar la muestra de sangre, administrar cloroquina y primaquina a las dosis mencionadas en el apartado 9.1.2.1 "Indicación". Ahora bien, la dosificación se refiere en la "Tabla 6".

**Tabla 6. Tratamiento supresivo en áreas *P. falciparum***

GRUPO DE EDAD	NUMERO DE COMPRIMIDOS DE CLOROQUINA DE 150 mg	NUMERO DE COMPRIMIDOS DE PRIMAQUINA DE 5 mg	NUMERO DE COMPRIMIDOS DE PRIMAQUINA DE 15 mg
< 6 meses	¼	0	0
6 meses a 1 año	½	½	0
2 a 5 años	1	1	0
6 a 12 años	2	2	0
13 años y más, con menos de 60 kg de peso	3	0	1
13 años y más, con más de 60 kg de peso	4	0	1

**9.1.3** Tratamiento de cura radical (TCR). La cura radical se logra aplicando diferentes esquemas terapéuticos y su efectividad varía de acuerdo a lo referido en la "Tabla 7".

**Tabla 7. Tratamientos de cura radical**

Esquema	Objetivo/Indicación	Eficacia estimada
Tratamiento Dosis Unica (TDU) con cloroquina y primaquina	Eliminar fuentes de infección para mosquitos. En distribución masiva o a los casos conocidos de los últimos tres años y sus convivientes, disminuye cargas parasitarias en la población. Util en caso de brotes o en áreas especiales de transmisión persistente y focalizada,	< 50%

	actualmente en áreas de alta transmisión se indica como primera elección al momento de tomar la gota gruesa y sustituye al supresivo-presuntivo	
Tratamiento de Cura Radical (TCR) a 5 días (cloroquina y primaquina)	Tratamiento en casos detectados en áreas hipo, meso e hiperendémicas. Puede administrarse en forma masiva o a casos y convivientes pero no como medida única de control	80%
Tratamiento de Cura Radical (TCR) a 14 días (cloroquina y primaquina)	Tratamiento alternativo para los casos de áreas hipoendémicas y cuando los dos esquemas de TCR anteriores no han sido suficientes	90%
Tratamiento Dosis Unica (TDU) con cloroquina y primaquina 3x3x3 o seguimiento por 3 años que equivale a 18 dosis mensuales	Su mayor utilidad es en casos repetidores. Elimina fuentes de infección para mosquitos	95%

Los cuatro esquemas empleados para cura radical mencionados en la "Tabla 7" son:

**9.1.3.1** Tratamiento en dosis única (TDU). Se aplica para disminuir, rápida y drásticamente la densidad de parásitos circulantes en un área específica.

**9.1.3.1.1** Indicaciones. En casos tratados de paludismo por *P. vivax*, se indica el tratamiento de dosis única estrictamente supervisado a todos los habitantes de viviendas con casos confirmados en los tres años previos, con especial énfasis en los enfermos o al 100% de la población cuando la localidad sea menor de 1000 habitantes. Se debe incluir a toda persona que sin tener radicación fija en la localidad que se atiende, se encuentre al momento de aplicar la medida, fundamentalmente cuando proceda de otras áreas con transmisión.

**9.1.3.1.2** Esquema de tratamiento en dosis única. El que se indica en la "Tabla 8".

**Tabla 8. Tratamiento en dosis única (TDU)**

GRUPO DE EDAD	NUMERO DE COMPRIMIDOS CLOROQUINA 150 mg	NUMERO DE COMPRIMIDOS PRIMAQUINA 5 mg	NUMERO DE COMPRIMIDOS PRIMAQUINA 15 mg
< 6 meses	¼	0	0
6 meses a 1 año	½	1	0
2 a 5 años	1	2	0
6 a 12 años	2	4	0
13 años y más, con menos de 60 kg de peso	3	0	2
13 años y más, con más de 60 kg de peso	4	0	3

**9.1.3.1.3** Precauciones especiales. En el caso de localidades con población de raza negra se debe evaluar la posibilidad de que se presenten reacciones adversas por el uso de primaquina; en caso de presentarse éstas, se empleará solamente cloroquina a las dosis indicadas en la "Tabla 8".

**9.1.3.2** Tratamiento de cura radical a cinco días, tal como se indica para la curación de casos individuales.

**9.1.3.2.1** Indicaciones. Se administra en días consecutivos a los casos confirmados y a sus convivientes en áreas hipodémicas, como se indica en la "Tabla 9".

**9.1.3.2.2** Esquema de cura radical a cinco días. El que se indica en la "Tabla 9".

**Tabla 9. Tratamiento de cura radical a cinco días**

GRUPO DE EDAD	Número de comprimidos de Cloroquina . 150 mg		Número de comprimidos de Primaquina por 5 días	
	Primer día	2o. al 4o. día	5 mg	15 mg
< 6 meses	¼	¼	0	0
6 meses a 1 año	½	½	½	0
2 a 5 años	1	¾	1	0
6 a 12 años	2	1	2	0
13 años y más, con menos de 60 kg de peso	3	1½	0	1
13 años y más, con más de 60 kg de peso	4	2	0	1

**9.1.3.3** Tratamiento de cura radical a catorce días, tal como se indica para la curación de casos individuales.

**9.1.3.3.1** Indicaciones. Se ministra en días consecutivos a los casos confirmados y sus colaterales en áreas con baja transmisión de la enfermedad. También se emplea en casos que después de ser tratados a cinco días, repitan cuadro clínico en áreas de mediana o alta transmisión, como se indica en la "Tabla 10".

**9.1.3.3.2** Esquema de cura radical a catorce días como se indica en la "Tabla 10".

**Tabla 10. Tratamiento de cura radical a catorce días**

GRUPO DE EDAD	Número de comprimidos Cloroquina, 150 mg		Número de comprimidos de Primaquina durante 14 días	
	Primer día	2° al 4° día	5 mg	15 mg
< 6 meses	¼	¼	0	0
6 meses a 1 año	½	½	½	0
2 a 5 años	1	¾	1	0
6 a 12 años	2	1	2	0
13 años y más, con menos de 60 kg de peso	3	1½	0	1
13 años y más, con más de 60 kg de peso	4	2	0	1

**9.1.3.4** Tratamiento de dosis única con periodicidad mensual, por tres meses consecutivos, se descansa tres meses y se repite el mismo por tres meses consecutivos hasta completar 18 dosis en tres años consecutivos.

**9.1.3.4.1** Indicaciones. En áreas con casos repetidores.

**9.1.3.4.2** Esquema de tratamiento de dosis única en dieciocho tomas. El mismo indicado en la "Tabla 8", administrado como se indica en el párrafo anterior, semanal o mensualmente en dosis continuas.

**9.1.4.1** Tratamiento de Infecciones Resistentes a la Cloroquina.

**9.1.4.1.1** Indicaciones. Se deben administrar los esquemas, por vía oral en casos leves y por vía parenteral en casos graves.

**9.1.4.1.2** Esquema de tratamiento para infecciones resistentes a cloroquina por vía oral. Se ministra durante seis días; del 1o. al 5o. día, sulfato de quinina a dosis de 25 mg por kg de peso, dividido en tres tomas, una cada 8 horas. El

60. día, dosis total única de primaquina, a 0.75 mg por kg de peso (máximo 3 comprimidos).

**9.1.4.1.3** Esquema de tratamiento para infecciones resistentes a cloroquina por vía parenteral. Para el tratamiento de infecciones palúdicas graves, se requiere de atención hospitalaria especializada urgente, que incluye: suministro de clorhidrato de quinina o gluconato de quinidina, en dosis inicial de 10 mg por kg de peso, diluido en solución fisiológica, por vía intravenosa en un lapso de dos a cuatro horas. Se continúa con dosis de mantenimiento de 5 mg por kg de peso del mismo medicamento y modo de aplicación durante un lapso de cuatro a ocho horas.

**9.1.4.1.4** Precauciones especiales. La velocidad de goteo en la venoclisis se disminuye cuando la concentración del medicamento en el plasma excede a los 6 mg por ml, si el intervalo QT del electrocardiograma es mayor de 0.6 segundos o si el intervalo QRS aumenta a más del 25%. La hipoglicemia asociada con la infección por *P. falciparum* puede exacerbarse debido a la hiperinsulinemia inducida por la quinina o quinidina y debe tratarse mediante la administración intravenosa de una solución de dextrosa. El tratamiento continuará hasta que la parasitemia se reduzca a menos del 1% y el paciente esté en condiciones de tolerar medicamentos por vía oral.

**9.1.4.1.5** Evaluación de la respuesta del *P. falciparum* a la cloroquina. A partir de la confirmación de un caso y la administración de una dosis de cloroquina de 25 mg por kg de peso, distribuida en tres días, se inicia el seguimiento con muestras sanguíneas durante el primer día y durante los días 3 y 7; posteriormente, los días 14, 21 y 28. La prueba de eficacia terapéutica estará a cargo de personal capacitado, y el seguimiento incluye registro de información básica del paciente, evaluación clínica, temperatura axilar, parasitemia y peso corporal en el día cero (antes del tratamiento), seguido del tratamiento supervisado con el medicamento estipulado.

**9.1.4.1.5.1** Criterios de inclusión para evaluación de susceptibilidad de *P. falciparum* a cloroquina. La clasificación de la resistencia de los parásitos a los medicamentos se hará de acuerdo a los siguientes estudios de evaluación:

**9.1.4.1.5.1.1** Una muestra estadísticamente correcta de los casos mayores de seis meses de edad.

**9.1.4.1.5.1.2** Monoinfección positiva por *P. falciparum* con densidad de 500 a 5,000 parásitos por microlitro.

**9.1.4.1.5.1.3** Antecedente de fiebre durante las últimas 72 horas.

**9.1.4.1.5.1.4** Pacientes procedentes del extranjero con diagnóstico confirmado.

**9.1.5** Tratamiento Profiláctico.

**9.1.5.1** Indicaciones. A las personas residentes en áreas libres de paludismo que se trasladan a zonas endémicas, tanto dentro como fuera del territorio nacional, se les administrará el tratamiento profiláctico, el primer día de llegada a la zona endémica, durante su permanencia en estos sitios y después de haberlos abandonado.

**9.1.5.2** Esquema de tratamiento profiláctico. Cloroquina de 150 mg a dosis de 5 mg por kilogramo de peso en dosis semanales desde dos semanas antes de viajar y dos comprimidos cada semana mientras permanezca en el lugar visitado; posteriormente, dos comprimidos cada semana y hasta dos semanas después de haber abandonado el área endémica.

**9.2** Tratamiento médico del Dengue. El manejo de las diferentes formas clínicas son críticas, especialmente en los casos graves.

**9.2.1** Dengue Clásico.

**9.2.1.1** Tratamiento sintomático. Debe utilizarse acetaminofén (no utilizar analgésicos ni antiinflamatorios no esteroides, como el ácido acetilsalicílico, naproxen o metamizol) y reposo en el hogar.

**9.2.1.2** Aislamiento. Evitar el contacto del enfermo con el mosquito vector, utilizando insecticidas de aplicación casera, mosquiteros, repelentes y malla-pabellón.

**9.2.1.3** Referencia. Ante la sospecha de dengue hemorrágico o choque, enviar de inmediato al paciente a una unidad de salud de segundo o tercer nivel, para su hospitalización y realizar comprobación serológica obligada.

**9.2.2** Dengue Hemorrágico o Síndrome de Choque.

**9.2.2.1** Todo paciente en el que se sospeche dengue clásico y tenga antecedentes de residir en áreas endémicas, debe ser considerado como caso potencial de dengue hemorrágico, por lo cual es muy importante que, tanto los médicos como los enfermos conozcan las conductas a seguir para evitar su agravamiento o la muerte. Debe tenerse en consideración que el manejo de los pacientes es clave para el pronóstico de la enfermedad.

**9.2.2.2** Los pacientes con sintomatología de dengue hemorrágico deben ser clasificados por su gravedad; así se podrá considerar el tratamiento ambulatorio con rehidratación oral en todos los casos con Grado I y II, a los cuales habrá de informarles sobre la importancia que tiene la identificación de los signos de alarma, ante los cuales deben asistir de inmediato a un hospital para su atención. Los pacientes con signos de alarma o diagnóstico de dengue hemorrágico o síndrome de choque por dengue, compatible con los Grados III y IV, serán hospitalizados de inmediato para su observación y estudio, así como para aplicar los criterios terapéuticos adecuados.

**9.2.2.3** En todos estos casos serán realizados diariamente estudios de laboratorio y gabinete para vigilar la hemoconcentración, la trombocitopenia y el derrame pleural o la ascitis así como tomar oportunamente las muestras de suero para el diagnóstico de dengue por laboratorio. Se debe tener presente que la ministración excesiva de líquidos conduce a más extravasación y de no moderarse, lleva a edema pulmonar agudo, insuficiencia cardiorrespiratoria y muerte. El tratamiento en la fase de choque tiene por objeto mantener la diuresis y no intentar corregir la hipotensión; ésta se corregirá gradualmente pasando las 12 a 24 horas críticas con un buen tratamiento de sostén.

**9.3** Tratamiento médico de la Oncocercosis. El medicamento para este padecimiento es la Ivermectina, el cual será administrado por personal de los servicios de salud o en su caso por promotores voluntarios capacitados. El enfermo será observado, cuando menos, durante los siguientes tres días después de ingerir el medicamento, para vigilar, registrar y tratar eventuales reacciones secundarias.

**9.3.1** Indicaciones. Se ministrará a todo caso confirmado y a la población elegible de las áreas de riesgo y consiste en la combinación del microfilaricida Ivermectina y de la extirpación de nódulos oncocercosos.

**9.3.2** Esquema de tratamiento con Ivermectina. Se ministra a casos confirmados y a la población elegible de las áreas de riesgo. Debe tratarse a los casos ya que son la única fuente de microfilarias para la infección de los simúlidos y a la población en riesgo para prevenir su infección y nuevos casos. Se administra Ivermectina a dosis de 150 microgramos por kg de peso, dosis única y por vía oral cada seis meses de acuerdo con la "Tabla 11".

**Tabla 11. Esquemas de tratamiento con Ivermectina**

Peso del Enfermo	Tabletas de Ivermectina 3 mg	Tabletas de Ivermectina 6 mg
15 - 24 kg	1 tableta	½ tableta
25 - 44 kg	2 tabletas	1 tableta
45 - 64 kg	3 tabletas	1½ tabletas
65 y más kg	4 tabletas	2 tabletas

**9.3.2.1** Precauciones especiales. Quedan excluidos de tomar Ivermectina los niños menores de cinco años o con peso inferior a 15 kg, mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia amamantando a niños con menos de una semana de nacidos, epilépticos, y enfermos oncocercosos con otros padecimientos intercurrentes o marcado ataque al estado general. Las reacciones secundarias a la Ivermectina generalmente son ligeras y autolimitadas, disminuyen con los tratamientos subsecuentes y se manifiestan como prurito, edema, rash, artralgias, mialgias, cefalea, hiperemia conjuntival, hipertermia e hipotensión arterial de intensidad variable. El tratamiento de estas reacciones es a base de antihistamínicos, analgésicos y antitérmicos, o con dexametasona en casos severos, acompañado de reposo en los casos de hipotensión arterial.

**9.3.3** Tratamiento quirúrgico. La eliminación de nódulos es primordial por ser los sitios de producción y liberación de microfilarias. Estas nodulaciones se detectan mediante exploración física, se extirpan quirúrgicamente con técnicas básicas en campo y en unidades de primer o segundo nivel. Es necesario enviar las muestras al laboratorio para identificar la presencia de microfilarias.

**9.4** Tratamiento médico de las Leishmaniasis. Será administrado y vigilado por personal médico capacitado en el manejo del padecimiento.

**9.4.1** Indicaciones. Se emplearán tres esquemas de tratamiento de primera elección, de acuerdo al tipo de Leishmaniasis, número y morfología de las lesiones: la aplicación de antimoniales por vía intralesionales; aplicación de antimoniales por vía intramuscular; y aplicación de calor local controlado (termocirugía). Se observa una tasa de recaídas del 14% en series controladas empleando antimoniales. Los medicamentos de elección en casos refractarios al

tratamiento inicial son: aplicación de antimoniales por vía intramuscular asociada a nifurtimox; aplicación de antimoniales por vía intralesional o intramuscular asociada a termocirugía y la pentamidina como sustituto de antimoniales.

**9.4.2** Esquema de tratamiento para la Leishmaniasis visceral (Kala-azar). El paciente debe recibir atención hospitalaria y tratamiento con antimonio de meglumina por vía intramuscular, o estibogluconato de sodio en solución inyectable intramuscular o intravenosa, a dosis de 60 mg (equivalente a 20 mg de antimonio) diarios por kg de peso, por un tiempo de 20 días consecutivos, sin exceder de tres gramos diarios. En caso necesario, se administra un segundo tratamiento, 15 días después, siguiendo el mismo esquema. Todo caso se tratará a nivel hospitalario y, la oportunidad con que se descubra, es decisiva para la curación.

**9.4.2.1** Esquema de segunda elección para la Leishmaniasis visceral. Los casos que no mejoren con los antimoniales, recibirán Anfotericina B, diariamente o tres veces por semana, por infusión intravenosa en 5% de dextrosa, durante un periodo de cuatro horas, iniciándose con una dosis de 5-10 mg, la cual puede aumentarse gradualmente por 5-10 mg en cada administración, hasta llegar a una dosis de 0.5-1.0 mg/kg de peso sin sobrepasar un total de 1-3 g. La duración exacta dependerá de la respuesta de cada paciente. El tratamiento siempre debe ser administrado en un hospital, a fin de vigilar el funcionamiento renal y cardíaco debido a que en pacientes sensibles puede afectarse el funcionamiento renal y cardíaco. Otro medicamento de segunda elección es la Pentamidina la cual se administrará a la dosis de 4 mg/kg de peso, tres veces por semana, durante cinco a 25 semanas. Se considera tóxico y con efectos secundarios, por lo que también, el tratamiento debe ser administrado siempre en un hospital.

**9.4.3** Leishmaniasis cutánea difusa.- Esta forma clínica, refractaria al tratamiento, mejora temporalmente con la administración de antimonio de meglumina o estibogluconato de sodio, a dosis de 60 mg (equivalente a 20 mg de antimonio) diarios por kg de peso, por un mínimo de 20 días consecutivos, sin exceder de tres gramos diarios, lo que equivale a 10 ml de antimonio de meglumina y a 8.5 ml de estibogluconato de sodio. En caso necesario, ante la exacerbación del cuadro clínico, este esquema se repite de dos a tres veces en el curso de un año.

**9.4.3.1** Esquema de segunda elección para la Leishmaniasis cutánea difusa. Si la aplicación de antimoniales no logra mejoría clínica, se agrega la administración oral de nifurtimox a dosis diarias de 10 mg por kg de peso corporal, repartido en tres tomas diarias, por un mínimo de cuatro semanas.

**9.4.4** Leishmaniasis cutánea americana o localizada. Se administra el antimonio de meglumina o estibogluconato de sodio como se describe en el apartado "9.4.3 Leishmaniasis cutánea difusa". En lesiones únicas, o múltiples de diámetro menor a 5 centímetros, los antimoniales se infiltran alrededor de la lesión. El esquema básico intralesional consiste en una aplicación semanal por un mínimo de cuatro semanas y no más de seis; si al término del tratamiento continúa el prurito e inflamación, esto pudiera corresponder a reacción local del medicamento por lo que se suspenderá el tratamiento dos semanas, se buscará la presencia de parásitos y de ser negativo, se dará por concluido el tratamiento. Un complemento de los medicamentos, es el calor local con vapor, termos o botellas tapadas que contengan agua caliente a 50-60°C colocadas sobre las lesiones.

**9.4.4.1** Tratamientos alternos. En Leishmaniasis cutánea localizada además se usa el calor controlado empleando un equipo de termocirugía por 30 segundos sobre los bordes activos de las lesiones, logra en una sola aplicación tasas de curación del 95%. La resección quirúrgica de las lesiones no se recomienda, por atribuírsele problemas de autoinoculación o metástasis por vía linfática.

**9.4.5** Leishmaniasis mucocutánea. En esta forma clínica, de difícil curación, también se administran antimoniales a las dosis citadas en el apartado "9.4.3 Leishmaniasis cutánea difusa", generalmente, los enfermos necesitan un segundo tratamiento. La Anfotericina B puede ser utilizada para los casos que no responda a los antimoniales y se administrará a la dosis mencionada en el apartado "9.4.2.1 Esquema de segunda elección para la Leishmaniasis visceral".

**9.4.6** Precauciones generales. Los medicamentos a base de antimonio causan efectos adversos en pacientes previamente cardiopatas o con enfermedad renal por lo que se deberán monitorear estas funciones durante el tratamiento. Los antimoniales empleados por vía intramuscular, se deben administrar en dosis parciales los primeros tres días hasta completar la dosis total según peso del paciente. En el caso de la infiltración perilesional de antimoniales, una aguja sólo penetrará el borde de la lesión una sola vez, de otra forma, se corre el riesgo de causar lesiones "satélite" de la lesión original por iatrogenia. Treinta días después de terminado cualquiera de los tratamientos, se valora la curación mediante estudios clínicos y de laboratorio; si persisten datos que sugieran alguna lesión activa o parasitoscopia positiva, es necesario reiniciar el tratamiento, de acuerdo con los esquemas antes referidos.



**9.5 Tratamiento médico de la Enfermedad de Chagas.** Tratamiento antiparasitario efectivo sólo mientras el parásito se encuentra circulante; una vez que ha causado lesiones en órganos blanco ya no es útil, por lo que el médico se limitará a la atención de las complicaciones.

**9.5.1 Indicaciones.** El medicamento debe ser ministrado en fase aguda, ya que previene daños posteriores; no obstante, durante la fase indeterminada tiene la capacidad de limitar los daños en pacientes menores de 18 años.

**9.5.2 Esquema de tratamiento en fase aguda e indeterminada.** En la fase aguda es muy útil el nifurtimox, un derivado del nitrofurfurilideno. En adultos se administra a dosis de 7 a 10 mg por kg de peso por día (máximo 700 mg al día). En los menores de 15 años, que toleran más el medicamento, la dosis es de 15 mg por kg de peso, repartidos en tres tomas diarias, durante sesenta días consecutivos. En los casos indeterminados menores de 18 años es útil el nifurtimox a las dosis citadas, para prevenir posibles complicaciones que se presentan en la fase crónica.

**9.5.2.1 Tratamiento alterno.** En casos graves también ha mostrado ser eficaz el benznidazol, un derivado del 2-nitroimidazol, a dosis de 5 mg por kg de peso al día en todas las edades, repartidas en dos tomas diarias durante treinta días ininterrumpidos. Debe existir vigilancia médica estrecha, en pacientes con antecedentes de daño hepático, renal, pulmonar y hematopatías.

**9.5.2.2 Esquema de tratamiento en fase crónica.** El tratamiento es sintomático y se dirige a limitar los daños.

**9.5.2.3 Chagas congénito.** La vigilancia de mujeres embarazadas con esta enfermedad será estricta, ya que un número importante de productos fallecen antes de nacer y, aquellos que sobreviven tienen una expectativa de vida menor a un año. Se ministrará al recién nacido el Benznidazol, a dosis diaria de 5 mg por kg de peso al día, durante 30 días consecutivos, esto disminuye el riesgo de morir.

**9.5.2.4 Precauciones especiales.** El medicamento está contraindicado en pacientes con daño cerebral, estados convulsivos, psicosis, así como en mujeres en periodo de lactancia. No ministrarlo en mujeres embarazadas.

**9.5.2.5 Valoración del tratamiento.** La evaluación en casos agudos se debe centrar en estudios parasitológicos y serológicos. La enfermedad de Chagas es de evolución crónica también y requiere una vigilancia sostenida durante años, sobre todo en los casos no tratados, tratados tardíamente o en forma incompleta. La vigilancia comprende el control del paciente en tratamiento, exámenes clínicos periódicos, parasitoscopías de sangre para verificar la erradicación de los tripanosomas circulantes, serología para conocer los niveles de anticuerpos y vigilancia de funcionamiento del corazón. El enfermo agudo puede considerarse como curado si dos exámenes diagnósticos consecutivos con treinta días de intervalo, resultan negativos; con frecuencia, los cuadros agudos tratados a tiempo remiten pronto hacia la curación. Si no se logra la mejoría un mes después de administrado el medicamento, se realizarán los estudios clínicos y de laboratorio y, según los resultados, se procede como sigue:

**9.5.2.6 Parámetros de evaluación del tratamiento y conducta a seguir.**

**9.5.2.7 Con parasitoscopia positiva.** Se considera y se administra nuevamente el tratamiento médico por 30 días.

**9.5.2.8 Con parasitoscopia y serología negativas.** Si ha pasado un mes de concluido el último tratamiento, se considera como curado al paciente.

**9.5.2.9 Con serologías positivas.** El caso se catalogará como activo, no sujeto a terapia con fármacos específicos, pero que requiere vigilancia médica anual, que incluya un electrocardiograma y pruebas serológicas.

**9.5.2.10 Casos tratados, no curados, en fase indeterminada.** Si durante su seguimiento presenten manifestaciones clínicas de etapa crónica de la enfermedad, se canalizan a un centro hospitalario con servicios especializados para su estudio y manejo.

**9.6 Tratamiento médico de las Rickettsiosis.**

**9.6.1 Indicaciones.** El tratamiento deberá de iniciarse con base en consideraciones clínicas y epidemiológicas, sin esperar la confirmación diagnóstica de laboratorio y, en el caso de enfermos graves, por la alta letalidad que presentan estos padecimientos.

**9.6.2 Esquema de tratamiento.** Los antibióticos indicados son doxiciclina, tetraciclinas y cloranfenicol. Las tetraciclinas han sido consideradas el medicamento de primera elección para el tratamiento de rickettsiosis pero tienen limitaciones para su uso; por ello se empleará la doxiciclina a dosis única de 200 mg en cualquier grupo de edad como tratamiento del tifus epidémico. El mismo esquema se emplea con fines de profilaxis.

**9.6.3** Precauciones especiales. Están contraindicadas las sulfas, ya que el desarrollo de las rickettsias aumenta en presencia de sulfonamidas, y la enfermedad se torna más grave. Las tetraciclinas se deben evitar durante el embarazo y en niños menores de 8 años, a los que se les podrá administrar cloranfenicol.

#### **9.7** Control de Vectores

**9.7.1** Se supervisará y evaluará en las localidades endémicas el aplanado de techos, pisos y paredes con cemento, al igual que el recubrimiento con hidróxido de calcio (cal viva) las paredes a fin de cubrir la superficie o rellenar las grietas en donde anidan algunos vectores, creando un ambiente hostil para éstos.

**9.7.2** Se supervisará y evaluará en las localidades endémicas, las protecciones para evitar el acceso de vectores a las viviendas, mediante la instalación de mallas de alambre o plástico en puertas y ventanas, así como el empleo para dormir de pabellones mosquiteros impregnados o no con insecticidas.

**9.7.3** Se supervisará y evaluará en las localidades endémicas, el saneamiento del peridomicilio; la no acumulación de recipientes, escombros, madera, tabiques, basura u otros objetos que proporcionan abrigo a vectores, además se deberá chapear la vegetación para evitar que esos vectores tengan refugios naturales y facilidad de acceso a las viviendas y a los animales domésticos.

**9.7.4** Se supervisará y evaluará en las localidades endémicas la eliminación de vegetación que favorece el desarrollo de larvas *An. Pseudopunctipennis*; la eliminación de algas verdes y verdeazules filamentosas ayuda a reducir considerablemente la densidad de larvas y mosquitos adultos cuando se realiza en ríos, arroyos o charcas durante la época de sequía; se debe capacitar y organizar al personal de los programas de salud y a la comunidad para que realicen estas acciones por lo menos una vez al mes durante todo el año; adicionalmente, debe integrarse la limpieza de basuras de los ríos y arroyos, remover obstáculos que puedan crear remansos, encausar recodos o lagunetas, eliminación de charcos artificiales y otro tipo de vegetaciones dentro de las localidades donde se reproduzca el anofelino, eliminando así las condiciones donde proliferan las larvas de mosquitos.

**9.7.5** Se supervisará y evaluará en las localidades endémicas la descacharrización. La eliminación de recipientes no útiles que retengan agua y que potencialmente constituyan criaderos del vector del dengue, es una medida complementaria para la que esta Norma establece, que debe ser una acción que parta de las autoridades municipales y de la comunidad, que tenga como objetivo disminuir la basura, incluidos los cacharros y que las autoridades locales de salud motivarán, apoyarán y evaluarán.

#### **9.8** Empleo de insecticidas y repelentes para proteger la salud pública.

**9.8.1** Se usarán productos que reúnan las siguientes condiciones:

**9.8.1.1** Que el producto cuente con las autorizaciones sanitarias que establezca la COFEPRIS.

**9.8.1.2** Que la población de insectos objeto del control no exhiba resistencia manifiesta al producto en laboratorio y campo.

**9.8.1.3** Que el insecticida demuestre eficacia biológica (mortalidad sobre insectos blanco) en campo.

**9.8.1.4** Que la población de insectos objeto del control sea susceptible a la dosis recomendada de campo al producto de interés.

**9.8.1.5** Que no exista evidencia científica de efectos adversos significativos en seres humanos, animales o ambiente, en las dosis recomendadas.

**9.8.1.6** Que no dañe los equipos de aplicación.

**9.8.1.7** Que se degrade y bio-transforme rápidamente en el ambiente.

**9.8.1.8** Que sean recomendados por agencias internacionales y/o que existan artículos científicos publicados sobre su eficacia en revistas internacionales con arbitraje.

**9.8.1.9** Que sean evaluados mediante protocolos estandarizados de investigación científica por, al menos, dos instituciones mexicanas recomendadas por el CENAVECE.

**9.8.1.10** Que no haya recomendaciones adversas significativas sobre su uso, emitidas por alguna institución o agencia nacional o internacional.

#### **9.8.2** Revisiones periódicas.

**9.8.2.1** Anualmente el CENAVECE emitirá una convocatoria para la revisión de nuevos productos a ser recomendados para su uso el año próximo en las campañas de salud pública.

**9.8.2.2** Anualmente el CENAVECE emitirá una convocatoria para revisar notificaciones sobre efectos adversos significativos de productos en uso para su no recomendación futura.

**9.8.2.3** Periódicamente, como resultado de las convocatorias señaladas en los numerales 9.8.2.1 y 9.8.2.2 se actualizará la lista de productos recomendados para su uso, misma que será publicada en la página de la Internet de la Secretaría de Salud.

**9.8.2.4** Los productos recomendados permanecerán en la lista a que se refiere el numeral anterior por el mismo periodo de vigencia que la COFEPRIS otorgue al registro sanitario respectivo o hasta que nuevos reportes indiquen algún efecto adverso o se emite alguna recomendación internacional negativa.

**9.8.2.5** Para la renovación de los productos recomendados deberán ser evaluados al término del periodo anterior.

**9.8.2.6** Las convocatorias señaladas en los puntos 9.8.2.1 y 9.8.2.2 deberán mencionar las siguientes pruebas de eficacia:

**9.8.2.6.1** Para adulticidas en rociados espaciales:

**9.8.2.6.1.1** En pruebas de penetración lineal, ocasione una mortalidad  $\geq 90\%$  a 80 m.

**9.8.2.6.1.2** En pruebas domiciliarias con obstáculos, ocasione una mortalidad  $\geq 75\%$ .

**9.8.2.6.2** Para adulticidas en rociados residuales:

**9.8.2.6.2.1** Mortalidad aguda  $\geq 98\%$ .

**9.8.2.6.2.2** Efecto residual  $\geq 75\%$  durante 4 meses como mínimo.

**9.8.2.6.3** Para adulticidas incorporados en mosquiteros de cama o cortinas:

**9.8.2.6.3.1** Se utilizan mosquiteros contruidos con materiales de larga duración impregnados con insecticida.

**9.8.2.6.3.2** Mortalidad aguda  $\geq 98\%$ .

**9.8.2.6.3.3** Resistencia a lavadas múltiples y efecto residual mínimo de 1 año.

**9.8.2.6.4** Para larvicidas

**9.8.2.6.4.1** Mortalidad aguda  $\geq 98\%$ .

**9.8.2.6.4.2** Efecto residual en productos químicos sintéticos y bio-racionales  $\geq 2$  meses.

**9.8.2.6.4.3** Efecto residual en productos biológicos  $\geq 3$  semanas.

**9.8.2.6.5** Para repelentes:

**9.8.2.6.5.1** Su efecto sea de al menos 6 horas de duración en  $\geq 90\%$  de las personas tratadas.

**9.8.2.6.5.2** No generen efectos adversos agudos ni crónicos.

**9.9** Métodos para la aplicación de insecticidas.

**9.9.1** El personal que aplique algún insecticida para el control de insectos vectores, debe contar con el equipo de protección personal recomendado por la OMS para reducir su exposición durante el manejo de los mismos.

**9.9.2** Control de formas larvarias. La aplicación de insecticida en los criaderos de vectores se hace manualmente, con bombas de compresión manual o con motomochilas. Los equipos de aplicación deben ser adaptados de acuerdo a la formulación de aplicación, la cual puede ser en seco o líquida.

**9.9.3** Control de mosquitos adultos con insecticidas de acción residual. La aplicación se hace con la técnica de aspersión con bombas de compresión manual para el rociado tradicional (RT), en donde se generan gotas  $> 100$  micras de diámetro medio de gota (DMG) o con motomochilas para el rociado rápido (RR) a bajo volumen (BV) aplicando gotas de 50-100 micras DMG. El insecticida es asperjado por RT o RR, sobre las superficies interiores, pared y techo, dentro de las viviendas y en el peridomicilio.

**9.9.4** Aplicaciones de acción efímera. Se aplican insecticidas en espacios abiertos y cerrados, en áreas urbanas y/o rurales, en los refugios naturales de los insectos, en interiores de casas habitación, edificios y locales. Se trata de los denominados rociados espaciales de aerosoles a Volumen Ultra Reducido (VUR) en neblina fría o nebulización térmica.

**9.10** Equipos de aplicación de insecticidas.

**9.10.1** Los rociados espaciales de aerosoles VUR asperjan insecticidas con equipos motorizados ligeros o pesados, que los fraccionan en gotas muy pequeñas para optimizar su flotabilidad el tiempo suficiente para contactar mosquitos y provocar su muerte.

**9.10.2** Equipos pesados. Las gotas óptimas esperadas para equipos pesados aplicando VUR son de 15-25 micras DMG. Deben además tener potencia suficiente para que el insecticida penetre hasta 100 metros, logrando dispersar la concentración saturando el ambiente, esperando además un rendimiento operativo aproximado de 60-100 manzanas o su equivalente en el área rural, por día de trabajo. Estas especificaciones las cumplen satisfactoriamente equipos de 8 a 18 HP.

**9.10.3** Equipos portátiles. Las gotas óptimas esperadas para los equipos ligeros aplicando VUR, son de 25-30 micras DMG. Las motomochilas deben contar con potencia suficiente para que el insecticida penetre hasta 50 metros. Con estos equipos se aplica insecticidas en exteriores y en interiores, especialmente durante brotes o en situaciones de alto riesgo entomológico.

**9.10.4** Introducción de nuevos equipos. Todo equipo que se introduzca para su uso en el programa, deberá ser evaluado considerando: flujo de descarga, tamaño de gotas que genere, capacidad para dispersar la niebla, alcance en áreas abiertas, penetración en casas habitación y anexos, rendimiento, funcionalidad y disponibilidad de refacciones. Las evaluaciones que realicen los servicios estatales de salud, deberán ser presentadas para su consideración a la Dirección del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector, antes de adquirir cualquier equipo diferente al disponible.

**9.11** Control de otros vectores

**9.11.1** Control de Triatóminos. Se puede realizar rociado residual en interiores usando productos que cumplan las condiciones del apartado 9.8.2.6.4

**9.11.2** Control de piojos. Se aplican insecticidas de baja toxicidad en cabeza, cuerpo y ropas de vestir o de cama en formulaciones de polvos, talco o jabones.

**9.11.3** Control de pulgas. Para evitar contacto con humanos, en caso de infestación en animales domésticos, se les aplica directamente el insecticida. Cuando hay ratas infestadas, se rocían insecticidas residuales en pisos y paredes hasta 30 cm de altura.

**9.11.4** Control de garrapatas. El uso de plaguicidas contra garrapatas (garrapaticidas), que infestan animales domésticos o ganado, se realiza mediante baños o rociado directo. Estas acciones se pueden coordinar con las acciones realizadas por la SAGARPA. En las viviendas y edificios se aplican los insecticidas de acción residual.

**10. Capacitación**

**10.1** El personal de los servicios del Sistema Nacional de Salud deberá recibir capacitación inicial y adiestramiento, de acuerdo con los manuales de organización y procedimientos vigentes para el fomento de la salud, la promoción y fomento sanitario de las comunidades, la búsqueda de los enfermos mediante la notificación y la pesquisa domiciliaria, los diagnósticos clínicos, virológicos, parasitoscópico y serológico, los estudios entomológicos, el suministro de los medicamentos, la investigación de los casos, y la aplicación de medidas contra los vectores. Esta capacitación deberá realizarse con periodicidad anual; el personal capacitado deberá ser evaluado. La responsabilidad de estas acciones recae en los responsables estatales y jurisdiccionales o sus equivalentes institucionales apoyados por el Programa Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector, incluyendo los aspectos de vigilancia epidemiológica (DGE) y laboratorio (InDRE).

**10.2** La capacitación de la población para el fomento de la salud se orienta hacia el autocuidado individual y familiar y la organización de la comunidad, con atención especial al riesgo de infectarse, enfermarse y morir de estas enfermedades. Se lleva a cabo mediante mensajes verbales y escritos, que se entregan en los domicilios, carteles fijos o murales, pláticas a grupos, y a través de los medios masivos de comunicación, con el propósito de motivar, informar, orientar y lograr la participación activa de los individuos y los grupos organizados, para facilitar y apoyar las actividades de vigilancia, prevención y control. La responsabilidad de esta capacitación recae en los responsables estatales y jurisdiccionales o sus equivalentes institucionales.

## 11. Investigación

**11.1 Fomento.** Se promoverá el interés de los programas con las instituciones en aspectos de investigación, para el desarrollo de las actividades de prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores, que establece esta Norma Oficial Mexicana, los organismos del Sector Salud podrán efectuar investigaciones básicas y operativas en aspectos epidemiológicos, entomológicos y mastozoológicos, así como en aspectos operativos, administrativos y socioeconómicos, con particular énfasis en los factores de riesgo y la evaluación.

## 12. Información

Los datos de las actividades de prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores, se registran simultáneamente a su ejecución, localmente, en los formularios vigentes y, su concentración y presentación, se realiza en los niveles jurisdiccional, estatal y el nacional, a través del SISPA. Los datos relativos a la notificación de casos y las defunciones, se anotan según lo establece la NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica.

## 13. Concordancia con normas internacionales y mexicanas

Esta Norma Oficial Mexicana es equivalente con los lineamientos y recomendaciones emitidos y difundidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y no es equivalente con ninguna norma mexicana.

## 14. Bibliografía

**14.1** Acta Leidensia. Proceedings of the Symposium on Genetic Variation of Malaria Parasites. Vol. 60(1). Leiden, Netherlands. 1991.

**14.2** Adak T., U. P. Sharma and V. S. Orlov. 1998. Studies on the *Plasmodium vivax* relapse pattern in Delhi, India. Am. J. Trop. Med. Hig; 59(1) pp. 175-179.

**14.3** Africare and the International Eye Foundation-Bob Pond Mass. Distribution of Ivermectin: A Handbook for Community Treatment of Onchocerciasis. Washington, D.C. 1991.

**14.4** Aguilar, J.F. Parasitología Médica. Guatemala, Guatemala, 1991.

**14.5** Agyepong I.A., Aryee B., Dziku H., and Manderson L. The malaria manual. TDR/SER/MSR/95.1

**14.6** Arredondo-Jiménez J.I. et al. Behaviour of *Anopheles albimanus* in relation to pyrethroid-treated bednets. Medical and Veterinary Entomology (1997) 11, 87-94.

**14.7** Arredondo-Jiménez J.I. y Cols. Efectividad de un insecticida carbamato en rociado intradomiciliar a bajo volumen para el control del paludismo. Salud Pública de México, 35(1):27-38.

**14.8** Birn A.E. 1998. Eradication, control or neither? Hookworm vs malaria strategies and Rockefeller Public Health in Mexico. Parassitologia 40:137-147.

**14.9** Bown D.N., Frederickson E.C., del Angel G., Méndez J.F. Effects of Bendicarb and Deltamethrin on *Anopheles albimanus* in a Mexican village. Bull PAHO 21(2) 1987.

**14.10** Bown D.N., Ríos J.R., del Angel G., Guerrero J.C. and Méndez J.F. Evaluation of chlorphoxim used against *Anopheles albimanus* on the south coast of Mexico. 1. Results of indoor clorphoxim applications and assessment of the methodology employed. Bull PAHO 18(4) 1984.

**14.11** Bown D.N., Ríos J.R., del Angel G., Guerrero J.C. and Méndez J.F. Evaluation of chlorphoxim used against *Anopheles albimanus* on the south coast of Mexico. 2. Use of curtain-trap techniques in a villages-scale evaluation trial. Bull PAHO 19(1) 1985.

**14.12** Catálogo oficial de plaguicidas de la Comisión Intersectorial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.

**14.13** Center for Disease Control and Prevention. Case definitions for public health surveillance. MMWR, 1990; 39 (RR-13): 10-11.

**14.14** Contacos P.G., W.E. Collins G.M. Jeffery, Krotosky W.A. and Howard. Studies on the characterization of *Plasmodium vivax* strains from Central America. Am. J. Trop. Med. Hig; 21(5) pp. 707-712.

- 14.15** Christophers, SR. *Aedes aegypti*. The yellow fever mosquito; Its life history, bionomics and structure. Cambridge University Press; 1980.
- 14.16** Díaz AG, Kourí MG, Guzmán L. *et al*. Cuadro clínico de la fiebre hemorrágica del dengue/Síndrome de choque del dengue en el adulto. Bol. Oficina Sanitaria Panam. 1988;104(6):560-571.
- 14.17** Dietz VJ, Nielburg P, Gubler DJ, Gómez I, Diagnosis of measles by clinical case definition in dengue-epidemic-areas: implications for measles surveillance and control. Bull World Health Organ. 1992;70(6): 745-750.
- 14.18** Enfermedades Tropicales en México. Diagnóstico, Tratamiento y Distribución Geográfica. José Luis Valdespino y Cols. Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. INDRE, SSA, agosto de 1994.
- 14.19** Entomología Médica y Veterinaria. Robert F. Harwood y Cols. Editorial Limusa, 1987.
- 14.20** Ewald W.P. Evolution of Infectious Disease. Oxford University Press. 1994.
- 14.21** Fundación Bicentenario de Simón Bolívar. La Escuela de Malariología y Saneamiento Ambiental y la Acción Sanitaria en las Repúblicas Latinoamericanas. Caracas, Venezuela, 1985.
- 14.22** Garavelli, P.L. and E. Corti. 1992. Chloroquine-resistant *Plasmodium vivax*: the first case in Brazil. Transactions of de Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 86, 128.
- 14.23** Gómez Dantés Héctor. Monografía sobre la epidemiología del dengue. SSA: México, 1993.
- 14.24** Goodman, Gilman y Cols. Bases Farmacológicas de la Terapéutica. 18a. Edición. Pergamon Press. 1997.
- 14.25** Gubler D.J, Kuno G. Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever. CAB International 1997.
- 14.26** Gubler D.J. Dengue and dengue hemorrhagic fever. Clinical Microbiology Reviews, July 1998. P.480-496.
- 14.27** Gubler DJ, Dietz VJ, Kuno G, *et al*. The 1986 dengue fever outbreak in Puerto Rico: epidemiologic observations. Am. J Trop Med Hyg. 1992.
- 14.28** Gubler, D.J. Ecology of *Aedes albopictus*. The Johns Hopkins Univ., CMRT. Annual Report. U.S.A. 1971.
- 14.29** Guía para la redacción, estructuración y presentación de las Normas Oficiales Mexicanas, SECOFI, 1993.
- 14.30** Guzmán MG, Kourí GP, Bravo J, *et al*. Dengue hemorrhagic fever in Cuba 1981: a retrospective seroepidemiologic study. Am J Trop Med Hyg. 1990, 42 (2): 179-184.
- 14.31** Halstead, S.B., Gómez Dantés H. Dengue; A worlwise problem, A common strategy, Ministry of Health, Mexico, Rockefeller Foundation. México, D.F. 1992.
- 14.32** Hellen Kelleer International. Comcatting Onchocerciasis. A five-Year Plan, New York, U.S.A., 1992.
- 14.33** Hernández-Montes O, McCann S, Monroy-Ostria & Barker DC. Identification of Mexican *Leishmania* species by analysis of PCR amplified DNA: Acta Tropica. 71: 139-153 (1998).
- 14.34** Hernández-Montes O, Monroy-Ostria A & Barker DC. Identification of *Leishmania* especies in Mexico. Trans. Roy. Soc. Trop. Med. And Hyg. 90: 449 (1996).
- 14.35** Hernández-Montes, O., Monroy- Ostria, A. & Barker, D.C. Use of molecular probes and PCR for detection and typing of *Leishmania* species in Mexico. J, of Microbiol. Meth, 30: 235 (1997).
- 14.36** Ibáñez, B.S. Los dípteros hematófagos de México. IV Simposium Nacional de Entomología Médica Veterinaria. México, D.F. 1989.
- 14.37** Ibragim A. M., F. El Rahaman A. Ali and Mohi Eldin M. Ali. 1992. Assessment If Chloroquine Resistance of *Plasmodium falciparum* in children of Wad Medani (Central Sudan). Journal of Tropical Pediatrics. 38:162-165.
- 14.38** Institute of Medicine. Malaria: Obstacles and Opportunities. National Academy Press, Washington, D.C. 1991.
- 14.39** Kaplan JE, Eliason DA, Moore M, *et al*. Epidemiological investigations of dengue infection in Mexico 1980. Am J. Epidemiol. 1983;117(335-343).

- 14.40** Keith, P.W. and McAdam, J. New Strategies in Parasitology Frontiers of Infectious Disease. Proceedings of an International Symposium Sponsored By Glaxo Research. Broocket Hall, Herfordshire, G.B., 1989.
- 14.41** Last-M. Diccionario de Epidemiología. España, 1989.
- 14.42** Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
- 14.43** Ley General de Salud.
- 14.44** Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- 14.45** Lineamientos Generales para la prevención y control del tifo. Septiembre de 1989.
- 14.46** Lineamientos para la Operatividad de los Programas de Rickettsiosis en los Estados, Secretaría de Salud. 1998.
- 14.47** Manual para el control de las enfermedades transmisibles. Abraham S. Benenson. Publicación Científica número 564, XVI Edición, OPS.
- 14.48** Martín Tellaeché A. Sugerencias para mejorar el control operativo para la Campaña de Lucha Contra la Oncocercosis. Memorias del Simposio Internacional sobre Oncocercosis. Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste. San Cristóbal de las Casas, Chis., 1979.
- 14.49** Mectizan Product Monography. Merck, Sharp & Dohme. New Jersey, U.S.A. 1988.
- 14.50** Memorias del Simposio Internacional sobre Oncocercosis. Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste. San Cristóbal de las Casas, Chis., 1979.
- 14.51** Memorias do Instituto Oswaldo Cruz. Río de Janeiro, Brasil, 1987.
- 14.52** Méndez-Galván J.F, Estudios de prevalencia del paludismo. Memorias del VI Congreso Nacional de Parasitología. Minatitlán, Veracruz, 1984.
- 14.53** Méndez-Galván J.F. and Fernández-Cerna E., Editores: Workshop on recent advances in community-based *Aedes aegypti* control: Honduras and México. Mérida, Yucatán, México 1996. Secretaría de Salud de México y Ministerio de Salud Pública de Honduras. (Memorias y material videograbado). Supported by Rockefeller Foundation.
- 14.54** Méndez-Galván J.F. y Cols. Evaluación de un esquema alternativo de tratamiento para el control del paludismo. Salud Pública de México, 26(6):561-572.
- 14.55** Méndez-Galván J.F., Montesano-Castellano R. Manual para la vigilancia epidemiológica del dengue, la fiebre hemorrágica del dengue y los mosquitos vectores. México, 1994.
- 14.56** Monroy-Ostria, A., Hernández-Montes, O. & Barker, D.C. Etiology of visceral Leishmaniasis in Mexico. Acta Tropica. (2000). 75: 155-165.
- 14.57** Monroy-Ostria, Sosa-Cabrera, T. Rivas-Sánchez, B., Ruiz-Tuyu, R., Mendoza-González, A:R & Favila-Castillo, L. Seroepidemiological studies of cutaneous leishmaniasis in the Campeche state of Mexico. Rev. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz. 92: 21-26 (1997).
- 14.58** Morse S.S. Emerging Viruses. Oxford University Press. 1993.
- 14.59** Mota J., O. Coreño, A. H. Cochrane and C. Ramos. 1996. Prevalence on antibodies to the repeat epitope of the circumsporozoite protein of the *Plasmodium vivax* in San Luis Potosí, Mexico. Archives of Medical Research. 1996. 27 (2): 233-236.
- 14.60** Murphy G. S., H. B. Purnomo, E.M. Andersen, M.J. Bangs, D.L. Mount, *et al.*, 1993. Vivax malaria resistant to treatment and prophylaxis with chloroquine. (341) 96-99.
- 14.61** Nájera J.A. and Hempel J. The burden malaria. WHO/MAL/96.10.
- 14.62** Nelson, M.J. *Aedes aegypti*: Biología y Ecología. Organización Panamericana de la Salud. Ref: PNSP/86-63. Washington, D.C., 1986.
- 14.63** Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-SSA2-1999, para la Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector (DOF. 19 de octubre de 1999).
- 14.64** Norma Técnica número 27, para la prevención y control de la oncocercosis en la atención primaria a la salud (DOF. 7 de julio de 1986).

**14.65** Norma Técnica número 348, para la prevención y control de la tripanosomosis, en la atención primaria a la salud (DOF. 17 de enero de 1992).

**14.66** Norma Técnica número 350, para la prevención y control del paludismo, en la atención primaria a la salud (DOF. 8 de abril de 1992).

**14.67** Norma Técnica número 353, para la prevención y control de Leishmaniasis, en la atención primaria a la salud (DOF. 19 de junio de 1992).

**14.68** Norma Técnica número 40, para la prevención y control del dengue, en la atención primaria a la salud (DOF. 8 de julio de 1986).

**14.69** OMS, La lucha antipalúdica como parte de la atención primaria de la salud, Informe de un Grupo de Estudio de la OMS. Serie de Informes Técnicos 712, Ginebra, 1984.

**14.70** OMS, La lucha antipalúdica y los objetivos nacionales de salud. Informe de la Séptima Conferencia Asiática sobre Paludismo. Serie de Informes Técnicos, 680, Ginebra, 1982.

**14.71** OMS, Manual de Ordenamiento del Medio para la Lucha contra los Mosquitos, con Especial Referencia a los Vectores del Paludismo. Ginebra, 1984.

**14.72** OMS, Quimioterapia Práctica del Paludismo. Informe del Grupo Científico de la OMS. Serie de Informes Técnicos, 805, Ginebra, 1993.

**14.73** OMS, Técnicas Entomológicas de Campo para la Lucha Antipalúdica. Parte I, Guía del Alumno. Ginebra, 1993.

**14.74** OMS, Técnicas Entomológicas de Campo para la Lucha Antipalúdica. Parte II, Guía del Instructor. Ginebra, 1993.

**14.75** OMS. 46a. Asamblea Mundial de la Salud. Prevención y Lucha contra el dengue. Informe del Director General, Ginebra, 1993.

**14.76** OMS. A.W.A. Brown PH.D. Resistencia de los artrópodos a los insecticidas. Ginebra, 1959.

**14.77** OMS. Control de la Enfermedad de Chagas. Informe del Comité de Expertos de la OMS, Serie de Informes Técnicos 811. Ginebra, 1991.

**14.78** OMS. Empleo inocuo de insecticidas. 14o. Informe del Comité de Expertos de la OMS. En Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial. Serie de Informes Técnicos 813. Ginebra. 1991.

**14.79** OMS. Las Leishmaniasis. Serie de Informes Técnicos, Ginebra, 1984.

**14.80** OMS. Lucha Contra las Leishmaniasis. Informe del Comité de Expertos de la OMS. Serie de Informes Técnicos 793. Ginebra, 1990.

**14.81** OMS. Métodos químicos de la lucha contra artrópodos, vectores y plagas de importancia para la salud pública. Ginebra. 1984.

**14.82** OMS/OPS Epidemiología, diagnóstico, tratamiento y control de las leishmaniasis en América Latina. Washington, D.C., 1992.

**14.83** OMS/OPS Epidemiología, Diagnóstico, Tratamiento y Control de las Leishmaniasis en América Latina 2a. Versión. Washington, D.C., 1994.

**14.84** OPS, Fleming, G. Biología y Ecología de los Vectores de la Malaria en las Américas. Washington, D.C. 1986.

**14.85** OPS. Informes Anuales de los Programas de Paludismo en las Américas, de los Años 1989-1992. Washington, D.C.

**14.86** OPS/OMS A Bibliography of Chagas. Disease (1968-1964) Washington, D.C., 1985.

**14.87** OPS/OMS *Aedes albopictus* en las Américas. 99a. Reunión. Grupo de trabajo del Comité Regional OMS., Washington, D.C. 1987.

**14.88** OPS/OMS, Conly, G.N. El impacto de la malaria sobre el desarrollo económico: estudio de casos, Publicación Científica 297, Washington, D.C. 1976.

**14.89** OPS/OMS. Diagnóstico de Malaria. Publicación Científica 512, Washington, D.C., 1990.



**14.90** OPS/OMS. Flebotomos: Vectores de Leishmaniasis en las Américas. Cuaderno de trabajo 33. Washington, D.C. 1989.

**14.91** Organización Mundial de la Salud. Comité de Expertos de la OMS en Oncocercosis, Tercer Informe. OMS; Ginebra, 1987 (Serie de Informes Técnicos, 752).

**14.92** Organización Mundial de la Salud. Dengue Hemorrágico: Diagnóstico, tratamiento y lucha. Ginebra 1987.

**14.93** Organización Mundial de la Salud. Plan Continental de Ampliación e Intensificación del Combate al *Aedes Aegypti*. Washington, 1997.

**14.94** Organización Mundial de la Salud. Prevención del dengue y de la fiebre hemorrágica de dengue (Prontuario para dirigentes municipales y comunitarios). Ginebra, 1994.

**14.95** Organización Mundial de la Salud. Resistencia de los vectores y reservorios de enfermedades a los plaguicidas. Décimo informe del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y lucha Antivectorial.

**14.96** Organización Mundial de la Salud. Tratamiento de la malaria no complicada y uso de medicamentos antimaláricos para la protección de los viajeros. Informe de la primera reunión oficiosa, Ginebra, 18 al 21 de septiembre de 1995.

**14.97** Organización Panamericana de la Salud, Dengue y dengue hemorrágico en las Américas: guías para su prevención y control. Washington, D.C. OPS, Publicación Científica número 548. 1995.

**14.98** Organización Panamericana de la Salud. Piojos de Importancia en Salud Pública y su Control. Publicación Científica número 74, diciembre de 1962.

**14.99** Organización Panamericana de la Salud. Seminario Taller Centroamericano sobre Estrategias para la Prevención y Control del Dengue y Dengue Hemorrágico. Washington, 1995.

**14.100** Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Plan multinacional estratégico y de acción para la eliminación de la oncocercosis en las Américas. River Blindness Foundation, International Eye Foundation, USAID. Merck, Sharp & Dohme, OPS/OMS. Washington, D.C. 1991.

**14.101** Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. Evaluación Oftalmológica de la Oncocercosis en las Américas. OPS/OMS: Antigua Guatemala, Guatemala. 1992 (Memorias del Taller de Evaluación Oftalmológica).

**14.102** Ortiz-Quezada F., Méndez-Galván J., Ritchie-Dunham J. Rosado-Muñoz J. Las organizaciones inteligentes en la toma de decisiones en salud: el caso del dengue. Salud Pública de México, Vol. 37, Suplemento 1995.

**14.103** Pang, T. Pathogenesis of Dengue Haemorrhagic Fever Towards a more Balance View. Southeast Asian J. Trop. Med. Pub. Health. Vol. 18 número 3. 1987.

**14.104** Penilla R.P. *et al.* Resistance management strategies in malaria vector mosquito control. Baseline data for the large-scale field trial against *Anopheles albimanus*. Medical and Veterinary Entomology (1998) 12. 217-233.

**14.105** Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

**14.106** Programa Nacional de Salud 2007-2012.

**14.107** Programa de Acción "Prevención y Control del Dengue 2007-2012".

**14.108** Programa de Acción "Prevención y Control del Paludismo 2007-2012".

**14.109** Programa de Acción "Prevención y Control de Otras Enfermedades Transmitidas por Vector 2007-2012".

**14.110** Pukrittayakamee S., S. Vanijanonta, A. Chantira, R. Clemens and N.J. White, 1994. Blood stage antimalarial efficacy of primaquine in *Plasmodium vivax* malaria. The Journal of Infectious Diseases. 169:932-5.

**14.111** Reunión Internacional de Enfermedades Transmisibles. Managua, Nicaragua. 1993.

**14.112** Rhone Poulenc Santé. Las Leishmaniasis en América Latina. París, Francia. 1992.

**14.113** Rigau-Pérez J.G., A.E.E.P.R. Manifestaciones clínicas del dengue hemorrágico en Puerto Rico, 1990-1991. Rev. Panam Salud Pública/Pan Am J Public Health (1(6):435. 1997.

- 14.114 Rioux, J.A. Lahotte, G. Petter, F. *et al.* Les Leishmaniosses Cutannes du bassin Mediterranéen Occidental. IMEEE, Montpellier, Francia. 1986.
- 14.115 Rodríguez M.H., L. González-Cerón, J.E. Hernández, J.A. Nettel, C.Villareal, K.C.Kaine and R.A. Wirtz. Different prevalences of the *Plasmodium vivax* phenotypes VK210 and VK247 associated with the distribution of *Anopheles albimanus* and *Anopheles pseudopunctipennis* in Mexico. *Am. J. Trop. Med. Hig*; 62(1) pp. 122-127.
- 14.116 Rodríguez-López M.H., Loyola E. E.G., Betanzos-Reyes A.F., Villarreal T. C. Baown D.N. Control focal del paludismo. *Gaceta Médica de México*, 130(5): 313-319. 1994.
- 14.117 SARH, SEDUE, SSA, SECOFI (CICOPLAFEST). Catálogo Oficial de Plaguicidas, México. D.F.
- 14.118 Schuurkamp G.J., P.E. Spicer R.K. Kereu, P.K. Bulungol and K.H. Rieckmann. 1992. in Papua, New Guinea. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*. 86,121-122.
- 14.119 Secretaría de Salud, Coordinación de Vigilancia Epidemiológica. Acciones emergentes de promoción y comunicación. México, 1997.
- 14.120 Secretaría de Salud, Coordinación de Vigilancia Epidemiológica. Dengue y dengue hemorrágico (Guía práctica para su diagnóstico, tratamiento y manejo). México, 1997.
- 14.121 Secretaría de Salud, Coordinación de Vigilancia Epidemiológica. Entomología, con énfasis en el control de vectores. Vol. I, México, 1997.
- 14.122 Secretaría de Salud, Coordinación de Vigilancia Epidemiológica. Entomología, con énfasis en el control de vectores. Vol. II, México, 1997.
- 14.123 Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Manual de procedimientos de laboratorio para dengue. México, 1997.
- 14.124 Secretaría de Salud/Organización Panamericana de la Salud. Estrategia y operación del Programa de Eliminación de la Oncocercosis en México. SSA/OPS: 1993 (Documento de trabajo).
- 14.125 Smoak B. L., R. F. DeFraités, A. J. Magill, K.C. Kain and B. T. Welde. 1997. *Plasmodium vivax* infection in U.S. Army Troops: Failure of primaquine to prevent relapse in studies from Somalia. *Am. J. Trop. Med. Hig*; 56(2) pp. 231-234.
- 14.126 Soberón, A.G. El Paludismo en México. Documento de Trabajo. El Colegio Nacional, México, 1986.
- 14.127 SSA Programa Nacional de Normalización 2007.
- 14.128 SSA. La Enfermedad de Chagas. Publicación Técnica del INDRE número 8. 1991.
- 14.129 SSA. Las Leishmaniasis en especial referencia a México. Publicación Técnica del IndRE número 7. México, D.F. 1991.
- 14.130 SSA. Manual de Toxicología. Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario. México, D.F. 1993.
- 14.131 SSA/CNEP, Breve Reseña Histórica de la Lucha Antipalúdica en México, México, D.F. 1979.
- 14.132 SSA/CNEP, Escamilla Gómez, C.A. Un Programa Moderno de Educación Sanitaria, México, 1964.
- 14.133 SSA/CNEP, Resumen de la Información para la Revisión de las Estrategias de la Campaña para Erradicar el Paludismo en México, México, D.F. 1972.
- 14.134 SSA/CNEP. Proyecto para la Erradicación del Paludismo en México, México, D.F. 1955.
- 14.135 SSA/CNEP. Vargas, G.L. y Martínez Palacios, A. Anofelinos Mexicanos, Taxonomía y Distribución. México, D.F. 1956.
- 14.136 SSA/DGMP-OPS, Informe de la Evaluación Externa del Programa de Prevención y Control del Paludismo, México, 1993.
- 14.137 SSA/Dirección General de Medicina Preventiva. Historia Natural del Paludismo, Dengue, Oncocercosis, Leishmaniasis y Tripanosomosis Americana.

- 14.138** SSA/OPS Técnicas de Aplicación de Insecticidas, Manejo y Mantenimiento de Equipos de Aspersión para el Control de Vectores de Paludismo y Dengue. México, D.F. 1993.
- 14.139** SSA/OPS. Principios de Epidemiología para el Control de la Malaria. México, 1990.
- 14.140** Susuki Takeshi. Una guía para la enfermedad de Robles (Oncocercosis) en Guatemala, con especial referencia al control del vector. Guatemala, 1993.
- 14.141** Tellaeche Martín A, Ramírez J., Santos J.I. and Méndez J.F.. Onchocerciasis: Changes in Transmission in Mexico. Annals of Tropical Medicine & Parasitology, Vol. 92, Supplement No. 1, S117-S119 1998.
- 14.142** Tifus Transmitido por Piojos. Normas y Documentos. Documento Técnico número 2, SSA, junio de 1979.
- 14.143** Tripanosomosis and Leishmaniasis with Special Reference to Chagas Disease. Ciba Foundation Symposium. Caracas, Venezuela. 1974.
- 14.144** Vaca M.A. y Cols. Aplicación intradomiciliar de malatión y deltametrina en bajo volumen para el control de *Anopheles sp.* Salud Pública de México 33(5):482, 1991.
- 14.145** Vallejo Reyes B. Manual: Técnicas de aplicación de insecticidas, manejo y mantenimiento de equipos de aspersión, para el control de vectores de paludismo y dengue. SSA, México, 1995.
- 14.146** Velasco Castrejón, O. Los agentes etiológicos de las Leishmaniasis en México. Presencia de la *L. Braziliensis*. Rev. Latinoamericana de Microbiología. México, D.F. 1989.
- 14.147** Vigilancia Mundial de las Rickettsiosis: Memorándum de una Reunión de la OMS. Boletín de la Oficina Panamericana, Vol. 177, número 2, Agosto, 1994.
- 14.148** Villalobos de Chacón, I. Manual de aspectos clínicos y terapéuticos del dengue. Hospital Central. Maracay, Venezuela, 1993.
- 14.149** Villarreal C. *et al.* Low-volume application by mist-blower compared with conventional compression sprayer treatment of houses with residual pyrethroid to control the malaria vector *Anopheles albimanus* in Mexico. Medical and Veterinary Entomology (1995) 9,187-194.
- 14.150** WHO Technical Reports Series número 892; WHO Expert Committee on Malaria, Twentieth Report. Geneve, 2000.
- 14.151** WHO, A Global Strategy For Malaria Control. Geneve, 1993.
- 14.152** WHO, Expert Committee on Malaria, Eighteenth Report Technical Report Serie735. Geneve, 1986.
- 14.153** WHO, Implementation of the Global Malaria Control Strategy Report of a WHO Study Group on the Implementation of the Global Plan of Action for Malaria Control. Geneva, 1993.
- 14.154** WHO. Control Technology for the formulation and packing of pesticides. Geneve. 1992.
- 14.155** WHO. Edited by D.C. Chavasse and H.H. Yap. Chemical methods for the control of vectors and pests of public health importance. WHO/CTD/WHOPES/97.2.
- 14.156** WHO. Guidelines on the use of insecticide-treated mosquito nets, for the prevention and control of malaria in Africa. Trial Edition. CTD/MAL/AFRO/97.4.
- 14.157** WHO. Interin specifications for pesticides used in public health. WHO/CTD/WHOPES/97.7.
- 14.158** WHO. Management on uncomplicated malaria and the use of antimalarial drugs for the protection of travellers. WHO/MAL/96.1075 Rev. 1. 1997.
- 14.159** WHO. Packaged treatment for first line care in cerebral malaria and meningitis. WHO/MAL/97.1083.
- 14.160** WHO. The diagnosis and management of severe and complicated falciparum malaria: Part. I Learner's Guide and Part II Tutor's Guide. Trial Edition, August 1996.
- 14.161** WHO/MAL/98.1084; Malaria Epidemics, Detection and Control Forecasting and Prevention; JA Nájera, RL Kouznetzsov and Delacollette. Malaria Prevention and Control Programme. World Health Organization, Division of Control of Tropical Diseases.1998.

**14.162** Winch P.J., Barrientos S.E., Puigserver C.E., Manzano C.L., Lloyd L.S. and Méndez J.F. Variation in *Aedes aegypti* larval Indices over a year period in neighborhood of Merida, Yucatan, Mexico. J.Am. Mosq. Control Assoc. 8(2):193-195. 1992.

**14.163** I Conferencia Interamericana para el Control de la Oncocercosis. IACO-91, México y Guatemala, 1991.

**14.164** II Conferencia Interamericana para el Control de la Oncocercosis, IACO-92, Quito, Ecuador, 1992.

**14.165** III Conferencia Interamericana para el Control de la Oncocercosis, IACO-93, Puerto Ayacucho, Amazonas, Venezuela, 1993.

**14.166** IX Conferencia Interamericana para el Control de la Oncocercosis, IACO-98, Puerto Ayacucho, Amazonas, Venezuela, 1998.

#### **15. Observancia de la Norma**

La vigilancia de la aplicación de esta Norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.

#### **16. Vigencia**

Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y tendrá una duración máxima de seis meses, de conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

México, D.F., a 8 de septiembre de 2008.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades y Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, **Mauricio Hernández Avila**.- Rúbrica.